

### 1.5.3 Násobek a dělitel čísla I

**Předpoklady:** 010502

**Pedagogická poznámka:** Tuto a následující hodinu (která je normálně zabírá pouze polovinu vyučovací hodiny) je možné probrat ve 45 minutách, pokud se nebude řešit příklad 1 a tabulku s rozdělením čísel pomocí násobků nebudou žáci sestavovat a samostatně zapisovat do sešitů a jenom ji promítnete z projektoru.

**Poznámka:** Až do konce kapitoly budeme uvažovat pouze přirozená čísla.

Platí:  $45 = 5 \cdot 9$  nebo  $45 = 9 \cdot 5$

Rovnost můžeme vyjádřit i slovně:

45 je násobkem 5.                      5 je dělitel 45.

45 je násobkem 9.                      9 je dělitel 45.

**Př. 1:** Doplně větu, kde je předchozí skutečnost popsána obecně.  
“Číslo  $a$  je násobkem čísla  $b$  (číslo  $b$  je dělitel čísla  $a$ ) právě tehdy, když existuje přirozené číslo  $k$  takové, že ...“

Číslo  $a$  je násobkem čísla  $b$  (číslo  $b$  je dělitel čísla  $a$ ) právě tehdy, když existuje přirozené číslo  $k$  takové, že  $a = k \cdot b$ .

Píše se také:  $b|a$  (čteme:  $b$  dělí  $a$ ).

Konkrétně:  $5|30$  (čteme: 5 dělí 30).

**Soudělná čísla** mají společného dělitele většího než 1.

**Nesoudělná čísla** mají jediného společného dělitele - číslo 1.

**Pedagogická poznámka:** Tabulku nechávám z co největší části vypracovat žáky (je třeba ohlídat, aby u dvojky použili zápis  $2 = 2 \cdot 1 + 0$  místo  $2 = 2 \cdot 0 + 2$ ). Po jejím doplnění dostanou žáci chvilku, aby se podívali, zda je v ní něco zajímavého. pokud se neobjeví očekávaný závěr, prohlédneme si druhý sloupec pomocí násobku čísel 2. Žáci přijdou na to, že se stále opakují pouze dva zbytky a je tedy možné rozdělit čísla do dvou skupin. Rozdělení podle zbytkových tříd 3 a čtyř pak udělají úplně sami.

Přirozená čísla můžeme zapisovat pomocí co největších násobků jiných přirozených čísel:

Číslo	Pomocí násobku 2	Pomocí násobku 3	Pomocí násobku 4
1	$2 \cdot 0 + 1$	$3 \cdot 0 + 1$	$4 \cdot 0 + 1$
2	$2 \cdot 1 + 0$	$3 \cdot 0 + 2$	$4 \cdot 0 + 2$
3	$2 \cdot 1 + 1$	$3 \cdot 1 + 0$	$4 \cdot 0 + 3$
4	$2 \cdot 2 + 0$	$3 \cdot 1 + 1$	$4 \cdot 1 + 0$
5	$2 \cdot 2 + 1$	$3 \cdot 1 + 2$	$4 \cdot 1 + 1$
6	$2 \cdot 3 + 0$	$3 \cdot 2 + 0$	$4 \cdot 1 + 2$
13	$2 \cdot 6 + 1$	$3 \cdot 4 + 1$	$4 \cdot 3 + 1$
...	...	...	...

Do tabulky bychom mohli napsat i další přirozená čísla.

Všechny přirozené čísla můžeme rozdělit do 2 skupin podle zbytku po dělení 2:

- zbytek 0  $\Rightarrow$  čísla zapsatelná ve tvaru  $2k + 0 = 2k$  (sudá čísla),
- zbytek 1  $\Rightarrow$  čísla zapsatelná ve tvaru  $2k + 1$  (lichá čísla).

Podobně pro 3 (ale tři skupiny):

- zbytek 0  $\Rightarrow$  čísla zapsatelná ve tvaru  $3k + 0 = 3k$ ,
- zbytek 1  $\Rightarrow$  čísla zapsatelná ve tvaru  $3k + 1$ ,
- zbytek 2  $\Rightarrow$  čísla zapsatelná ve tvaru  $3k + 2$ .

Pro 4 jsou čtyři skupiny:  $4k$ ,  $4k + 1$ ,  $4k + 2$ ,  $4k + 3$ .

**Př. 2:** Zapiš skupiny, do kterých můžeme rozdělit přirozená čísla podle zbytků po dělení pěti. Ke každé skupině napiš ta z čísel  $\{10; 2; 9; 26; 155, 48\}$ , která do ní patří.

Při dělení šesti můžeme získat pět různých hodnot zbytku 0 až 4  $\Rightarrow$  skupiny:

- $5k - \{10, 155\}$ ,
- $5k + 1 - \{26\}$ ,
- $5k + 2 - \{2\}$ ,
- $5k + 3 - \{48\}$ ,
- $5k + 4 - \{9\}$ .

**Předchozí poznatek obecně**

**Každé přirozené číslo  $n$  lze pomocí přirozeného čísla  $b > 1$  vyjádřit jedním z výrazů:**

$bk, bk + 1, bk + 2, \dots, bk + (b - 1)$ , kde  $k \in N_0$ .

(stručnější zápis:  $\forall n \in N, \forall b \in N, b > 1: n = bk + z, z \in \{0, 1, \dots, b - 1\}, k \in N_0$ .)

Množině čísel, které můžeme každým takovým výrazem vyjádřit, se říká **zbytková třída**  $\Rightarrow$  přirozená čísla je tedy možné podle zbytku po dělení dvěma rozdělit do dvou zbytkových tříd:  $2k$  a  $2k + 1$ .

**Př. 3:** Platí  $17 = 2 \cdot 6 + 5$ . Které z konkrétních čísel uvedených v předchozí rovnosti odpovídá jednotlivým písmenům z předchozí věty ( $n, b, k, z$ )?

17 je číslo, které rozkládáme na součin  $\Rightarrow n = 17$ .

5 je zbytek po dělení (proto označení  $z$ )  $\Rightarrow$  písmeno  $z = 5$ .

Čísla 2 a 6 vystupují v součinu  $\Rightarrow$  jedno z nich je  $b$ , druhé  $k$ . Číslo  $b$  je číslo, které používáme k rozkladu na skupiny, musí být větší než největší zbytek  $\Rightarrow$  platí  $b = 6, k = 2$ .

**Pedagogická poznámka:** Předchozí příklad není zbytečný. Studenti mají často tendenci zcela ignorovat jakákoliv obecná tvrzení (viz hodina 010507). Jediný problém u předchozího příkladu nastává při určování hodnoty  $b$ , protože v součinu  $kb$  je oproti větě prohozeno pořadí (schválně). Kontrolu samozřejmě provádíme diskusí u tabule bez využití projektoru.

**Pedagogická poznámka:** Pojem zbytkové třídy neuvádím proto, aby se ho žáci museli učit. Nikdy ho nezkouším, ani nedávám do prověrek. Jde pouze o to, aby ho slyšeli, protože se s ním mohou setkat.

**Shrnutí:** Všechna přirozená čísla můžeme rozdělit podle zbytků po dělení číslem  $k$  do  $k$  skupin.