

## 2.4.5 Kreslení grafů funkcí metodou dělení definičního oboru II

**Předpoklady:** 2404

Opakování: Pokud se v částech definičního oboru funkce chová různým způsobem rozdělíme si definiční obor na části a v každé z nich řešíme graf samostatně.

Pro absolutní hodnoty:


- zjistíme, kdy se mění znaménko uvnitř a tím rozdělíme definiční obor na intervaly
- v každém intervalu odstraníme všechny absolutní hodnoty a vypočteme výslednou funkci
- pro každou funkci nakreslíme graf
- každý z grafů vytáhneme v intervalu, pro který platí.

**Pedagogická poznámka:** Stejně jako v předchozí hodině se dá očekávat obrovský rozptyl v rychlosti postupu. Hlavně u příkladu 3 je však třeba dát pozor, aby rychlejší studenti neměli příklad špatně (kvůli odstraňování absolutní hodnoty).

**Př. 1:** Nakresli pomocí metody dělení definičního oboru graf funkce  $y = |x+2| + x - 1$ .

Zjistíme nulový bod absolutní hodnoty:

$$|x+2|: x+2=0 \Rightarrow x=-2$$




$\Rightarrow$  dva intervaly



$$1) x \in (-\infty; -2) \quad x+2 \leq 0 \Rightarrow |x+2| = -x-2$$

$$y = |x+2| + x - 1 = -x - 2 + x - 1 = -3$$

$$2) x \in (-2; \infty) \quad x+2 \geq 0 \Rightarrow |x+2| = x+2$$

$$y = |x+2| + x - 1 = x + 2 + x - 1 = 2x + 1$$






**Pedagogická poznámka:** Mezi jednotlivými učiteli panují rozdíly v tom, zda a jak zahrnovat hraniční body do intervalů, ve kterých příklad řešíme. Pokud jde o postup, je to úplně jedno, ten je stejný. Určité nejasnosti by mohly nastat u výsledků v případě, že by řešením byl jeden z krajních bodů. V takovém případě je třeba, aby byl krajní bod zahrnut alespoň do jednoho z intervalů (je jedno kterého), což je řešení používané většinou učitelů. Já osobně normálně zahrnuji krajní body do všech intervalů s tím, že se pokud krajní bod řešením je, musí vyplynout z každého intervalu a pokud vyplyne pouze z jednoho, jde o jasný znak chyby ve výpočtu.

**Př. 2:** Nakresli graf funkce  $y = |x+1| + |x| + 1$ .

Zjistíme nulové body jednotlivých absolutních hodnot:

$$|x+1|: x+1=0 \Rightarrow x=-1$$

$$|x|: x=0$$



$\Rightarrow$  tři intervaly

$$1) x \in (-\infty; -1) \quad x+1 \leq 0 \Rightarrow |x+1| = -x-1 \quad x < 0 \Rightarrow |x| = -x$$




$$y = |x+1| + |x| + 1 = -x-1 - x + 1 = -2x$$

$$2) x \in (-1; 0) \quad x+1 > 0 \Rightarrow |x+1| = x+1 \quad x < 0 \Rightarrow |x| = -x$$

$$y = |x+1| + |x| + 1 = x+1 - x + 1 = 2$$

$$3) x \in (0; \infty) \quad x+1 > 0 \Rightarrow |x+1| = x+1 \quad x \geq 0 \Rightarrow |x| = x$$

$$y = |x+1| + |x| + 1 = x+1 + x + 1 = 2x+2$$




**Pedagogická poznámka:** V předchozím příkladu se pozná, kteří studenti mají opravdu jasno v důvodech, které vedou k zapisování intervalů, pro které platí vypočítané funkce. Pro ty, kteří dosud postupovali automaticky, bude potřeba příklad částečně vyřešit na tabuli. Já počítám předpis funkce v prvním intervalu, zbývající dva nechávám na studentech a kontrolujeme je až později.

**Př. 3:** Nakresli graf funkce  $y = |1 - x| + |2 + x| - x$ .

Zjistíme nulové body jednotlivých absolutních hodnot:

$$|1 - x|: 1 - x = 0 \Rightarrow x = 1$$

$$|2 + x|: 2 + x = 0 \Rightarrow x = -2$$



$\Rightarrow$  tři intervaly

$$1) x \in (-\infty; -2) \quad 1 - x \geq 0 \Rightarrow |1 - x| = 1 - x \quad 2 + x \leq 0 \Rightarrow |2 + x| = -2 - x$$




$$y = |1 - x| + |2 + x| - x = 1 - x - 2 - x - x = -1 - 3x$$

$$2) x \in (-2; 1) \quad 1 - x \geq 0 \Rightarrow |1 - x| = 1 - x \quad 2 + x \geq 0 \Rightarrow |2 + x| = 2 + x$$

$$y = |1 - x| + |2 + x| - x = 1 - x + 2 + x - x = 3 - x$$

$$3) x \in (1; \infty) \quad 1 - x \leq 0 \Rightarrow |1 - x| = -1 + x \quad 2 + x \geq 0 \Rightarrow |2 + x| = 2 + x$$

$$y = |1 - x| + |2 + x| - x = -1 + x + 2 + x - x = 1 + x$$



**Pedagogická poznámka:** Studenti mají problémy s odstraňováním absolutní hodnoty  $|1-x|$ , je třeba dát pozor, aby rychlejší studenti neměli tuto chybu v sešitu příliš dlouho.

**Př. 4:** Nakresli graf funkce  $y = |2x-1| - |1-x| + x - 1$ .

Zjistíme nulové body jednotlivých absolutních hodnot:

$$|2x-1|: \quad 2x-1=0 \Rightarrow x=0,5$$

$$|1-x|: \quad 1-x=0 \Rightarrow x=1$$



$\Rightarrow$  tři intervaly

$$1) \ x \in (-\infty; 0,5) \quad 2x-1 \leq 0 \Rightarrow |2x-1| = -2x+1 \quad 1-x \geq 0 \Rightarrow |1-x| = 1-x$$




$$y = |2x-1| - |1-x| + x - 1 = -2x+1 - (1-x) + x - 1 = -1$$

$$2) \ x \in \langle 0,5; 1) \quad 2x-1 \geq 0 \Rightarrow |2x-1| = 2x-1 \quad 1-x \geq 0 \Rightarrow |1-x| = 1-x$$

$$y = |2x-1| - |1-x| + x - 1 = 2x-1 - (1-x) + x - 1 = 4x-3$$

$$3) \ x \in \langle 1; \infty) \quad 2x-1 \geq 0 \Rightarrow |2x-1| = 2x-1 \quad 1-x \leq 0 \Rightarrow |1-x| = -1+x$$

$$y = |2x-1| - |1-x| + x - 1 = 2x-1 - (-1+x) + x - 1 = 2x-1$$



- Př. 5:** Na základě výsledků příkladů v této a předchozí rovině navrhní:
- volbu bodů, ve kterých je nutné počítat funkční hodnoty při kreslení grafů částečných lineárních funkcí vzniklých v jednotlivých intervalech
  - nejrychlejší způsob řešení obtížnějších příkladů

Všechny zkonstruované grafy byly lomené nepřerušované čáry  $\Rightarrow$

**a)** Pro kreslení jednotlivých lineárních funkcí je nejlepší volit hodnoty v nulových bodech, protože získané body náležejí vždy dvěma částečným funkcím v intervalech, které v daném nulovém bodu sousedí.

**b)** Pro zakreslení jednotlivých částečných lineárních funkcí nám stačí hodnoty v nulových bodech, které ohraničují interval, pro který lineární funkci kreslíme  $\Rightarrow$  nejrychleji můžeme postupovat takto:

- najdeme nulové body
- určíme hodnoty funkce v nulových bodech (a tedy i všechny částečné lineární funkce v omezených intervalech)
- určíme předpisy částečných lineárních funkcí v neomezených intervalech (nebo další dvě funkční hodnoty)
- dokreslíme graf funkce

**Př. 6:** Pomocí úspornější metody z předchozího úkolu nakresli graf funkce

$$y = |x - 4| - |2x - 4| + |x + 3| - |1 - x| + 2|x| - 4.$$


Procházíme jednotlivé nulové body a počítáme funkční hodnoty:

- $|x-4| \Rightarrow x=4$   
 $y = |x-4| - |2x-4| + |x+3| - |1-x| + 2|x| - 4 =$   
 $= |4-4| - |2 \cdot 4 - 4| + |4+3| - |1-4| + 2|4| - 4 = 4$   
 $\Rightarrow \text{bod } [4;4]$
- $|2x-4| \Rightarrow x=2$   
 $y = |x-4| - |2x-4| + |x+3| - |1-x| + 2|x| - 4 =$   
 $= |2-4| - |2 \cdot 2 - 4| + |2+3| - |1-2| + 2|2| - 4 = 6$   
 $\Rightarrow \text{bod } [2;6]$
- $|x+3| \Rightarrow x=-3$   
 $y = |x-4| - |2x-4| + |x+3| - |1-x| + 2|x| - 4 =$   
 $= |(-3)-4| - |2 \cdot (-3) - 4| + |(-3)+3| - |1-(-3)| + 2|(-3)| - 4 = -5$   
 $\Rightarrow \text{bod } [-3;-5]$
- $|1-x| \Rightarrow x=1$   
 $y = |x-4| - |2x-4| + |x+3| - |1-x| + 2|x| - 4 =$   
 $= |1-4| - |2 \cdot 1 - 4| + |1+3| - |1-1| + 2|1| - 4 = 3$   
 $\Rightarrow \text{bod } [1;3]$
- $|x| \Rightarrow x=0$   
 $y = |x-4| - |2x-4| + |x+3| - |1-x| + 2|x| - 4 =$   
 $= |0-4| - |0 \cdot 1 - 4| + |0+3| - |1-0| + 2|0| - 4 = -2$   
 $\Rightarrow \text{bod } [0;-2]$

Dopočteme hodnotu pro  $x$  menší než nejmenší nulový bod a pro  $x$  větší než největší nulový bod:

- $x=6$   
 $y = |x-4| - |2x-4| + |x+3| - |1-x| + 2|x| - 4 =$   
 $= |6-4| - |2 \cdot 6 - 4| + |6+3| - |1-6| + 2|6| - 4 = 6$   
 $\Rightarrow \text{bod } [6;6]$
- $x=-6$   
 $y = |x-4| - |2x-4| + |x+3| - |1-x| + 2|x| - 4 =$   
 $= |(-6)-4| - |2 \cdot (-6) - 4| + |(-6)+3| - |1-(-6)| + 2|(-6)| - 4 = -2$   
 $\Rightarrow \text{bod } [-6;-2]$

Zakreslíme do grafu vypočtené body a poté je spojíme lomenou čarou:




**Dodatek:** Na první pohled se zdá, že jsme od začátku měli používat metodu z předchozího příkladu. Tato metoda má však dvě zásadní nevýhody:  
 Nemá z ní příliš dobře vidět, na čem metoda stojí.  
 Nemá možné ji použít pro jiné druhy funkcí s absolutními hodnotami (tyto funkce nás čekají v dalších kapitolách).

**Př. 7:** (BONUS) Nakresli graf funkce  $y = ||x+1|-1| + x+1$ .

Zjištění nulových bodů bude problém, pro vnější absolutní hodnotu nevíme, jaká čísla dodá vnitřní absolutní hodnota  $\Rightarrow$  nejdříve odstraním vnitřní absolutní hodnotu:

$$|x+1|: x+1=0 \Rightarrow x=-1$$



$\Rightarrow$  dva intervaly

**1)**  $x \in (-\infty; -1)$

$$x+1 \leq 0 \Rightarrow |x+1| = -x-1$$

$$y = ||x+1|-1| + x+1 = |-x-1-1| + x+1 = |-x-2| + x+1$$

teď odstraníme vnější absolutní hodnotu

$$|-x-2|: -x-2=0 \Rightarrow x=-2$$

**1a)**  $x \in (-\infty; -2)$

$$-x-2 \geq 0 \Rightarrow |-x-2| = -x-2$$

$$y = |-x-2| + x+1 = -x-2 + x+1 = -1$$

**1b)**  $x \in (-2; -1)$

$$-x-2 \leq 0 \Rightarrow |-x-2| = -(-x-2) = x+2$$

$$y = |-x-2| + x+1 = x+2 + x+1 = 2x+3$$

**2) vracíme se k vnitřní absolutní hodnotě**

$x \in (-1; \infty)$

$$x+1 \geq 0 \Rightarrow |x+1| = x+1$$

$$y = ||x+1|-1| + x+1 = |x+1-1| + x+1 = |x| + x+1$$

teď odstraníme vnější absolutní hodnotu

$$|x|: \quad x = 0$$

$$2)a) \quad x \in \langle -1; 0 \rangle$$




$$x \leq 0 \Rightarrow |x| = -x$$

$$y = |x| + x + 1 = -x + x + 1 = 1$$

$$2)b) \quad x \in \langle 0; \infty \rangle$$

$$x \geq 0 \Rightarrow |x| = x$$

$$y = |x| + x + 1 = x + x + 1 = 2x + 1$$



**Pedagogická poznámka:** Nikdo nepředpokládá, že předcházející příklad udělají všichni. Pokud se to povede alespoň někomu, bude to úspěch.

**Př. 8:** Petáková:  
strana 28/cvičení 40  $m_1, m_2$

**Shrnutí:** Postupným odstraňováním absolutních hodnot můžeme nakreslit i grafy funkcí s vloženými absolutními hodnotami (jen se to nesmí uspěchat).