

## 5.2.10 Vzdálenost rovin

**Předpoklady:** 5209

Kdy má cenu uvažovat o vzdálenosti dvou rovin?  
Pouze, když jsou rovnoběžné, jinak se protínají.


**Př. 1:** Navrhni definici vzdálenosti dvou rovnoběžných rovin.

Za vzdálenost dvou rovnoběžných rovin považujeme vzdálenost libovolného bodu jedné roviny od druhé roviny.

**Př. 2:** Je dána standardní krychle  $ABCDEFGH$ ,  $|AB| = a = 4\text{ cm}$ . Urči vzdálenost rovin:


- a)  $ABC$  a  $EFG$                       b)  $ABC$  a  $EFS_{CG}$                       c)  $ADS_{BF}$  a  $S_{AE}FG$   
d)  $AFH$  a  $BDG$

a) vzdálenost rovin  $ABC$  a  $EFG$




roviny  $ABC$  a  $EFG$  jsou navzájem rovnoběžné, obě jsou vodorovné  $\Rightarrow$  svislý směr je kolmý na obě.  
Zvolíme například bod  $E \Rightarrow$  jeho kolmým průmětem do roviny  $ABC$  je bod  $A$ , pro délku úsečky  $AE$  platí:  $|AE| = a = 4\text{ cm}$ .

b) vzdálenost rovin  $ABC$  a  $EFS_{CG}$




roviny  $ABC$  a  $EFS_{CG}$  nejsou rovnoběžné a nemá smysl uvažovat o jejich vzdálenosti

c) vzdálenost rovin  $ADS_{BF}$  a  $S_{AE}FG$



Obě roviny jsou rovnoběžné a kolmé na přední stěně. Vzdálenost můžeme vypočítat například pomocí bodu  $S_{AE}$ .

Jeho kolmý průmět leží také v přední stěně, nakreslíme si přední stěnu (čtverec  $ABEF$ ) a z něj příklad vypočteme:




Potřebujeme zjistit délku úsečky  $AS_{BF}$ , například z trojúhelníku  $ABS_{BF}$ .

$$|AS_{BF}|^2 = |AB|^2 + |BS_{BF}|^2 = a^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2$$

$$|AS_{BF}|^2 = a^2 + \frac{a^2}{4} = \frac{5}{4}a^2$$

$$|AS_{BF}| = \frac{\sqrt{5}}{2}a$$

Doplňme vzdálenost do obrázku.




Můžeme využít podobnosti trojúhelníků  $APS_{AE}$  a  $S_{BF}BA$ .

$$\frac{|S_{AE}P|}{|S_{AE}A|} = \frac{|AB|}{|AS_{BF}|} \Rightarrow |S_{AE}P| = |S_{AE}A| \frac{|AB|}{|AS_{BF}|}$$


$$|S_{AE}P| = |S_{AE}A| \frac{|AB|}{|AS_{BF}|} = \frac{a}{2} \frac{a}{\frac{\sqrt{5}}{2}a} = \frac{a}{2} \frac{2}{\sqrt{5}} = \frac{a}{\sqrt{5}} = a \frac{\sqrt{5}}{5}$$

Dosadíme:  $|S_{AE}P| = a \frac{\sqrt{5}}{5} = 4 \cdot \frac{\sqrt{5}}{5} \text{ cm} = 1,79 \text{ cm}$

d) vzdálenost rovin  $AFH$  a  $BDG$



Příklad nejnáze vyřešíme v rovině  $ACE$ , která je kolmá k oběma rovinám a tak bude vždy obsahovat bod z jedné roviny i jeho kolmý průmět do roviny druhé.




Potřebujeme určit délku úsečky  $AS_{EG}$  (například z pravoúhlého trojúhelníku  $AES_{EG}$ ):

$$|AS_{EG}|^2 = |EA|^2 + |ES_{EG}|^2 = a^2 + \left(\frac{a\sqrt{2}}{2}\right)^2$$

$$|AS_{EG}|^2 = a^2 + \frac{2}{4}a^2 = \frac{3}{2}a^2$$

$$|AS_{EG}| = a\sqrt{\frac{3}{2}}$$



Využijeme podobnost trojúhelníků  $AS_{EG}S_{AC}$  a  $AS_{AC}P$ .

$$\frac{|S_{AC}S_{EG}|}{|AS_{EG}|} = \frac{|PS_{AC}|}{|AS_{AC}|} \Rightarrow |PS_{AC}| = |AS_{AC}| \frac{|S_{AC}S_{EG}|}{|AS_{EG}|}$$

$$|PS_{AC}| = |AS_{AC}| \frac{|S_{AC}S_{EG}|}{|AS_{EG}|} = \frac{a\sqrt{2}}{2} \frac{a}{a\sqrt{\frac{3}{2}}}$$

$$|PS_{AC}| = a \frac{\sqrt{2}\sqrt{2}}{2\sqrt{3}} = \frac{a}{\sqrt{3}} = a\frac{\sqrt{3}}{3}$$

Dosadíme:  $|PS_{AC}| = a\frac{\sqrt{3}}{3} = 4\frac{\sqrt{3}}{3} \text{ cm} = 2,31 \text{ cm}$

**Pedagogická poznámka:** V bodě b) studenti často píšou, že vzdálenost rovin je nulová.


Snažím se jim vysvětlit, že není rozumné u nerovnoběžných rovin tvrdit, že mají nulovou vzdálenost, když vzdálenosti různých bodů jedné z rovin od druhé roviny jsou zcela různé.

V bodě c) studenti často zapomenou na to, že vzdálenost musí zjišťovat pomocí kolmice a určit jako vzdálenost rovin délku úsečky  $S_{AE}A$ . Proto píšou na tabuli, že 2 cm nejsou správný výsledek.


Pokud studentům ukážete prostorový obrázek první části řešení bodu d), nakreslí někteří správně obdélník  $ACGE$  i s průsečnicemi obou rovin, ale bod, s jehož pomocí zjišťují vzdálenost obou rovin, nakreslí doprostřed (případně na úhlopříčku) a nedokáží pak v obrázku najít žádné použitelné trojúhelníky. Je potřeba jim zdůraznit, že mohou vybrat libovolný bod jedné z rovin a musí si proto zvolit tak, aby řešení bylo co nejjednodušší (pak jsou body na stranách obdélníku jasnou volbou).

**Pedagogická poznámka:** Následující příklad obsahuje trochu neobvyklý (i když často velice účinný) krok – použití pohledu z jiné strany. Pokud studenti nestíhají, přerušuji práci na předchozích příkladech, abychom si alespoň začátek příkladu s nakreslením obou obrázků stihli a studenti zjistili, že není nutné kreslit pokaždé všechny obrázky ze stejného pohledu.

**Př. 3:** Je dán pravidelný čtyřboký jehlan  $ABCDV$ ,  $|AB| = a = 4 \text{ cm}$ ,  $|SV| = v = 5 \text{ cm}$ . Urči vzdálenost rovin  $ABV$  a  $S_{BC}S_{CV}S_{AD}$ .




Situace je z tohoto pohledu nečitelná  $\Rightarrow$  nakreslíme si obrázek tak, abychom místo hrany  $AB$  viděli přímo hranu  $BC$ .




Z obrázku vidíme, že obě roviny jsou rovnoběžné (mají rovnoběžné průsečnice s rovinami podstavy a s rovinou  $BCV$ )  $\Rightarrow$  má smysl hovořit o jejich vzdálenosti, kterou určíme pomocí průsečnice s rovinou  $S_{AB}S_{CD}V$  (je kolmá k oběma rovinám).

Nakreslíme si trojúhelník  $S_{AB}S_{CD}V$  a v něm průsečnice obou rovin:



- rovina  $ABV$  se s rovinou  $S_{AB}S_{CD}V$  protíná v přímce  $S_{AB}V$
  - rovina  $S_{BC}S_{CV}S_{AD}$  se s rovinou  $S_{AB}S_{CD}V$  protíná v přímce  $YA$
- $\Rightarrow$  vzdálenost obou rovin můžeme určit například pomocí bodů  $SP$  z podobnosti trojúhelníků  $SPS_{AB}$  a  $SS_{CD}V$ .




Délku strany  $S_{CD}V$  určíme z trojúhelníka  $SS_{CD}V$  pomocí Pythagorovy věty:

$$|S_{CD}V|^2 = |SV|^2 + |SS_{CD}|^2 = v^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2$$

$$|S_{CD}V|^2 = v^2 + \frac{a^2}{4} = \frac{4v^2 + a^2}{4}$$

$$|S_{CD}V| = \frac{\sqrt{4v^2 + a^2}}{2}$$

Dopíšeme zjištěnou délku do obrázku:



Z podobnosti trojúhelníků  $SS_{AB}P$  a  $SS_{CD}V$ .

$$\frac{|PS|}{|S_{AB}S|} = \frac{|SV|}{|S_{CD}V|} \Rightarrow |PS| = |S_{AB}S| \frac{|SV|}{|S_{CD}V|}$$


$$|PS| = |S_{AB}S| \frac{|SV|}{|S_{CD}V|} = \frac{a}{2} \frac{v}{\frac{\sqrt{a^2 + 4v^2}}{2}}$$

$$|PS| = \frac{2av}{2\sqrt{a^2 + 4v^2}} = \frac{av}{\sqrt{a^2 + 4v^2}}$$

Dosadíme:  $|PS| = \frac{av}{\sqrt{a^2 + 4v^2}} = \frac{4 \cdot 5}{\sqrt{4^2 + 4 \cdot 5^2}} \text{ cm} = 1,86 \text{ cm}$


**Pedagogická poznámka:** Následující příklad je poměrně obtížný ve své početní fázi, kdy je nutné poměrně zdlouhavě počítat délky úseček.

**Př. 4:** Je dán pravidelný čtyřstěn  $ABCD$ ,  $|AB| = a = 6 \text{ cm}$ . Urči vzdálenost rovin  $ABC$  a  $S_{BC}S_{AC}S_{CD}$ .




Z obrázku vidíme, že obě roviny jsou rovnoběžné (mají rovnoběžné průsečnice s rovinami podstavy a s rovinou  $ACD$ )  $\Rightarrow$  má smysl hovořit o jejich vzdálenosti, kterou určíme pomocí průsečnic s rovinou  $S_{AB}CD$  (je kolmá k oběma rovinám).

Nakreslíme si trojúhelník  $S_{AB}CD$  a v něm průsečnice obou rovin:



- rovina  $ABD$  se s rovinou  $S_{AB}CD$  protíná v přímce  $S_{AB}D$
- rovina  $S_{BC}S_{AC}S_{CD}$  se s rovinou  $S_{AB}CD$  protíná v přímce  $SS_{CD}$

$\Rightarrow$  vzdálenost obou rovin můžeme určit například pomocí bodů  $SP$  z podobnosti trojúhelníků  $SPS_{AB}$  a  $DD_0S_{AB}$ .




Délku výšky  $S_{AB}D$  určíme z pravoúhlého trojúhelníka  $S_{AB}BD$ :

$$|S_{AB}D|^2 = |BD|^2 - |S_{AB}B|^2 = a^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2$$

$$|S_{AB}D|^2 = \frac{4a^2 - a^2}{4} = \frac{3a^2}{4}$$

$$|S_{AB}D| = \frac{a\sqrt{3}}{2}$$

Dopíšeme zjištěnou délku do obrázku:




Platí:  $|S_{AB}S| = \frac{a\sqrt{3}}{4}$ , protože trojúhelník  $S_{AB}CD$  je rovnoramenný.

Pokud chceme použít podobnost trojúhelníků  $SPS_{AB}$  a  $DD_0S_{AB}$  musíme určit výšku  $|DD_0|$ .

Použijeme vzorec pro obsah trojúhelníka:

$$S = \frac{av_a}{2} = \frac{bv_b}{2} \Rightarrow a \cdot v_a = b \cdot v_b$$

$\Rightarrow$  musíme určit výšku v trojúhelníku na stranu  $DC$




Délku výšky  $S_{AB}S_{CD}$  určíme z pravoúhlého trojúhelníka  $S_{AB}CS_{CD}$ :

$$|S_{AB}S_{CD}|^2 = |S_{AB}C|^2 - |CS_{CD}|^2 = \left(\frac{a\sqrt{3}}{2}\right)^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2$$

$$|S_{AB}S_{CD}|^2 = \frac{3a^2}{4} - \frac{a^2}{4} = \frac{2a^2}{4} = \frac{a^2}{2}$$

$$|S_{AB}S_{CD}| = \frac{a}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}a$$

Vypočteme výšku:




$$S = \frac{av_a}{2} = \frac{bv_b}{2} \Rightarrow a \cdot v_a = b \cdot v_b \Rightarrow v_a = \frac{b \cdot v_b}{a}$$

Dosadíme:

$$v_a = \frac{b \cdot v_b}{a} = \frac{|DC| \cdot |S_{AB}S_{DC}|}{|S_{AB}C|} = \frac{a \cdot a \frac{\sqrt{2}}{2}}{a \frac{\sqrt{3}}{2}} = a \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$$

Doplňme výšku do původního obrázku a dopočteme vzdálenost rovin:



Z podobnosti trojúhelníků  $SPS_{AB}$  a  $DD_0S_{AB}$ .

$$\frac{|PS|}{|S_{AB}S|} = \frac{|D_0D|}{|S_{AB}D|} \Rightarrow |PS| = |S_{AB}S| \frac{|D_0D|}{|S_{AB}D|}$$

$$|PS| = |S_{AB}S| \frac{|D_0D|}{|S_{AB}D|} = \frac{a\sqrt{3}}{4} \frac{a\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}}{a\frac{\sqrt{3}}{2}}$$

$$|PS| = \frac{a \cdot 2\sqrt{3}\sqrt{2}}{4 \cdot 3} = \frac{a\sqrt{6}}{6}$$

Dosadíme:  $|PS| = \frac{a\sqrt{6}}{6} = \frac{6 \cdot \sqrt{6}}{6} \text{ cm} = 2,45 \text{ cm}$

**Př. 5:** Petáková:  
strana 93/cvičení 28 b)

**Shrnutí:**