

9.3.4 Charakteristiky variability

Předpoklady: 9303

Př. 1: Při fyzikálním praktiku měřili studenti tloušťku dřevěného kvádříku. Petr měřil pravítkem a naměřil tyto hodnoty (v mm): 50; 50; 51; 51; 50. Jarda použil šupleru a získal tyto výsledky (v mm): 50,5; 50,4; 50,4; 50,2; 50,5. Urči průměrnou tloušťku kvádříku podle výsledků obou měření. Rozhodni, zda jsou jejich výsledky rovnocenné.

$$\text{Průměr podle Petra: } \bar{x} = \frac{50 + 50 + 51 + 51 + 50}{5} = 50,4.$$

$$\text{Průměr podle Jardy: } \bar{x} = \frac{50,5 + 50,4 + 50,4 + 50,2 + 50,5}{5} = 50,4.$$

Ačkoliv oba získají stejnou průměrnou hodnotu, jejich výsledky rovnocenné nejsou, protože jednotlivá měření prováděná Jardou se od výsledného průměru liší podstatně méně než měření prováděná Petrem. Jarda měřil daleko přesněji.

Pedagogická poznámka: Může se Vám stát, že se žáci začnou divit, jak je možné, že Jarda s Petrem pokaždé naměřili něco jiného. V takovém případě nezbyvá než v krátkosti vysvětlit, jak probíhá opravdové fyzikální měření.

Předchozí příklad je ukázkou situace, ve které není důležité pouze okolo jaké hodnoty jednotlivé výsledky kolísají, ale i to, jak moc kolísají \Rightarrow hledáme charakteristiku **variability (proměnlivosti)** znaku.

Jak spočítat číslo, které vyjádří, jak moc se změřené hodnoty liší od průměru?

První nápad: uděláme průměr z jednotlivých odchylek.

Př. 2: Urči průměr z odchylek jednotlivých měření od průměru pro obě sady hodnot z příkladu 1.

$$\text{Petr: } \frac{(50 - 50,4) + (50 - 50,4) + (51 - 50,4) + (51 - 50,4) + (50 - 50,4)}{5} = 0.$$

$$\text{Jarda: } \bar{x} = \frac{(50,5 - 50,4) + (50,4 - 50,4) + (50,4 - 50,4) + (50,2 - 50,4) + (50,5 - 50,4)}{5} = 0.$$

Proč náš pokus selhal?

Část odchylek je kladná, část záporná \Rightarrow společně se odečtou na nulu (už když jsme počítali průměr, počítali jsme ho tak, aby odchylky na obě strany byly stejné) \Rightarrow musíme zajistit, aby se odchylky navzájem neodečítaly \Rightarrow dvě nejjednodušší možnosti:

- absolutní hodnota $|x_i - \bar{x}|$,
- druhá mocnina $(x_i - \bar{x})^2$.

Základní charakteristikou proměnlivosti je rozptyl, který je definovaný jako

$$\text{průměr druhých mocnin odchylek od aritmetického průměru } s_x^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2.$$

Uvedený vzorec je pro počítání poměrně těžkopádný. Je možné ho upravit takto:

$$\begin{aligned} s_x^2 &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i^2 - 2x_i\bar{x} + \bar{x}^2) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 - 2\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i\bar{x} + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \bar{x}^2 = \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 - 2\bar{x} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i + \frac{1}{n} n \bar{x}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 - 2\bar{x} \bar{x} + \bar{x}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 - 2\bar{x}^2 + \bar{x}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 - \bar{x}^2 \end{aligned}$$

$$s_x^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 - \bar{x}^2$$

Pedagogická poznámka: Předchozí odvození si jenom ukážeme, neztrácíme čas tím, že si ho studenti budou opisovat do sešitů.

Pedagogická poznámka: Z mých zkušeností se zdá, že pro žáky by byl přijatelnější vzorec s absolutní hodnotou. Jako jeden z důvodů, proč dát přednost vzorcí s druhou mocninou, uvádím právě větší možnosti úprav (s absolutní hodnotou moc úprav nenaděláme).

Př. 3: Urči rozptyl pro měření Petra a Jardy pomocí obou vzorců.

Petr:

$$\begin{aligned} s_x^2 &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \\ &= \frac{1}{5} \left[(50 - 50,4)^2 + (50 - 50,4)^2 + (51 - 50,4)^2 + (51 - 50,4)^2 + (50 - 50,4)^2 \right] = 0,240 \end{aligned}$$

$$s_x^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 - \bar{x}^2 = \frac{1}{5} (50^2 + 50^2 + 51^2 + 51^2 + 50^2) - 50,4^2 = 0,240$$

Jarda:

$$\begin{aligned} s_x^2 &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \\ &= \frac{1}{5} \left[(50,5 - 50,4)^2 + (50,4 - 50,4)^2 + (50,4 - 50,4)^2 + (50,2 - 50,4)^2 + (50,5 - 50,4)^2 \right] = 0,0120 \end{aligned}$$

$$s_x^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 - \bar{x}^2 = \frac{1}{5} (50,5^2 + 50,4^2 + 50,4^2 + 50,2^2 + 50,5^2) - 50,4^2 = 0,0120$$

Výsledky jsou stejné podle obou vzorců a navíc zachycují to, co jsme chtěli. Do ideálního stavu ještě něco chybí: měřili jsme délku (v mm), ale rozptyl je průměr druhých mocnin (a je tedy v mm²).

$$\Rightarrow \text{směrodatná odchylka: } s_x = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad (\text{absolutní chyba})$$

$$\Rightarrow \text{variační koeficient: } v_x = \frac{s_x}{\bar{x}} \cdot 100\% \quad (\text{relativní chyba } \delta_x)$$

Př. 4: Urči směrodatnou odchylku a variační koeficient obou měření.

Petr:

$$s_x = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} = \sqrt{0,240} = 0,490 \quad v_x = \frac{s_x}{\bar{x}} \cdot 100\% = \frac{0,490}{50,4} \cdot 100\% \doteq 0,97\%$$

Jarda:

$$s_x = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} = \sqrt{0,0120} = 0,110 \quad v_x = \frac{s_x}{\bar{x}} \cdot 100\% = \frac{0,110}{50,4} \cdot 100\% \doteq 0,22\%$$

Při výpočtu aritmetického průměru jsme si pomocí četností mohli značně usnadnit výpočet
 \Rightarrow stejným způsobem zkusíme upravit i vzorec pro rozptyl.

Př. 5: Uprav vzorec pro výpočet rozptylu pro výpočet tak, aby vycházel z četností jednotlivých hodnot místo hodnot naměřených pro všechny jednotky.

$s_x^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 - \bar{x}^2 \Rightarrow$ pokud se stejná hodnota opakuje vícekrát, musíme ji neustále znova zadávat \Rightarrow stačí četností zadat kolikrát se tato hodnota (ve výpočtu rozptylu její druhá mocnina) opakuje $\Rightarrow s_x^2 = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^r x_j^{*2} n_j - \bar{x}^2$ (sčítáme přes možné hodnoty, kterých je pouze r a každá se opakuje n_j krát).

Př. 6: Sestav tabulku četností pro znak doba strávená studiem a využij ji pro výpočet směrodatné odchylky.

Znak nabývá pouze tří hodnot:

doba strávená studiem x_j^*	2	3	4
četnost n_j	3	13	3

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^r x_j^* n_j = \frac{2 \cdot 3 + 3 \cdot 13 + 4 \cdot 3}{19} = 3$$

$$s_x = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{j=1}^r x_j^{*2} n_j - \bar{x}^2} = \sqrt{\frac{2^2 \cdot 3 + 3^2 \cdot 13 + 4^2 \cdot 3}{19} - 3^2} = 0,562$$

Používání rozptylu a směrodatné odchylky je svázáno s používáním aritmetického průměru. Pokud charakterizujeme polohu pomocí $\text{Mod}(x)$ nebo $\text{Med}(x)$, měl bychom použít místo rozptylu **mezikvartilovou odchylku**.

Co je kvartil?

Podobně jako medián je kvartil případ kvantilu:

- medián – dělí seřazené jednotky na dvě poloviny,
- kvartily - dělí seřazené jednotky na čtyři čtvrtiny,
- decily - dělí seřazené jednotky na deset desetin,
- percentily - dělí seřazené jednotky na sto setin.

První kvartil Q_1 je čtvrtinová hodnota (nebo také medián z hodnot $x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq \text{Med}(x)$),
třetí kvartil Q_3 je tříčtvrtinová hodnota (nebo také medián z hodnot $x_n \geq x_{n-1} \geq \dots \geq \text{Med}(x)$).

Mezikvartilová odchylka $Q(x) = \frac{Q_3 - Q_1}{2}$.

Př. 7: Urči Q_1 , Q_3 a $Q(x)$ pro velikost postavy ze statistického výzkumu.

x_j^*	160	165	170	175	180	185	190
n_j	1	1	4	6	4	2	1

Celkem 19 hodnot \Rightarrow 10. hodnota je medián.

Q_1 je prostřední hodnota z prvních deseti hodnot \Rightarrow jde o průměr 5. a 6. hodnoty

$$Q_1 = \frac{170 + 170}{2} = 170.$$

Q_3 je prostřední hodnota z posledních deseti hodnot \Rightarrow jde o průměr 14. a 15. hodnoty

$$Q_3 = \frac{180 + 180}{2} = 180.$$

$$Q(x) = \frac{Q_3 - Q_1}{2} = \frac{180 - 170}{2} = 5$$

Kvantily se používají pro vyjadřování relativního umístění v nějakém pořadí. Například pokud dosáhnete percentil 92%, znamená to, že 92% účastníků je v pořadí za Vámi.

Př. 8: Příjímacího řízení se zúčastnilo 756 studentů. Petr získal umístění v 85 percentilu. Urči, kolik procent studentů uspělo v testu hůře než on. Kolik studentů uspělo lépe než on? Jaké pořadí by mohl celkově zaujímat? Kolik studentů se umístilo v šestém decilu?

85 percentil \Rightarrow 85 % studentů uspělo hůře.

100% ... 756 studentů

85% ... $756 \cdot 0,85 = 642,6 \Rightarrow 642$ studentů se umístilo hůře než Petr

\Rightarrow Petr se umístil na $756 - 642 = 114$ místě.

Decil dělí skupinu na deset částí \Rightarrow v každém decilu se umístilo 76 (75) studentů.

Př. 9: Petáková:
 strana 175/cvičení 69
 strana 175/cvičení 70

Shrnutí: Charakteristiky vyjadřují míru proměnlivosti znaku (jak moc se liší jednotlivé hodnoty jedna od druhé).