

9.3.6 Statistické výpočty na kalkulačce

Předpoklady: 9301, 9302, 9303, 9304, 9305

Pedagogická poznámka: Tato a následující hodina samozřejmě nemají žádnou oporu v klasických učebnicích, ale o to jsou blíže realitě. Každý středoškolský student má kalkulačku a 95% těchto kalkulaček umí provádět statistické výpočty. Bohužel nikdy jsem ve třídě nenašel více než dva žáky, kteří by je uměli používat (slovy jedné studentky „návod je přece to první, co se vyhazuje“).

V dnešní době jen velmi zřídka někdo počítá statistické veličiny ručně pomocí vzorců, které jsme si ukazovali. Tupou práci za matematika vykoná:

- kalkulačka,
- počítač.

Počítání na kalkulačkách

Přesný způsob, jakým se statistika na jednotlivých kalkulačkách používá, se liší, ale základní filozofie statistiky je na kalkulačkách stejná:

1. přepneme do statistického módu (SD, STAT, S, ...) a vynulujeme paměť,
2. zadáme hodnoty, ze kterých potřebujeme zjistit statistické údaje,
3. pomocí tlačítek vyvoláváme hodnoty statistických veličin kalkulačkou spočtených ze zadaných údajů.

Jak statisticky zpracovat hodnoty 2,1; 2,2; 2,2? (příklad na kalkulačce CASIO fx-570MS)

1. přepneme do statistického módu SD a vynulujeme paměť

- přepnutí do statistického módu: MODE, MODE, 1
- vynulování paměti: SHIFT, CLR, 1, =

2. zadáme hodnoty, ze kterých potřebujeme zjistit statistické údaje

- zadávání dat (napíšeme hodnotu a stiskneme klávesu DT): 2.1 DT 2.2 DT 2.2 DT (mohli jsme využít opakování pro rychlejší zadání 2.1 DT 2.2 DT DT)

Hodnoty jsou uloženy v kalkulačce \Rightarrow můžeme se tázat na statistické veličiny.

3. pomocí tlačítek vyvoláváme hodnoty statistických veličin

Statistické veličiny jsou často rozděleny do dvou skupin

S-SUM (volíme je takto: SHIFT, S-SUM, číselný kód, =)

- počet záznamů n ($n = 3$),
- součet hodnot prvků souboru $\sum x$ ($\sum x = 6,5$),
- součet druhých mocnin prvků souboru $\sum x^2$ ($\sum x^2 = 14,09$).

S-VAR (volíme je takto: SHIFT, S-VAR, číselný kód, =)

- aritmetický průměr \bar{x} ($\bar{x} = 2,16666667$),
- směrodatná odchylka s_x (častěji značená δ_n) $\delta_n = 0,047140452$,
- výběrová směrodatná odchylka δ_{n-1} ($\delta_{n-1} = 0,057735026$).

Dodatek: S přepínáním do statistického módu problémy nebývají (často bývá popsán na krabičce nebo přímo na kalkulačce), horší je mazání paměti. Doporučuji u neznámých kalkulaček bez návodu hledat tlačítka Scl, Cl nebo SAC (často s pomocí SHIFT). Stejný rozptyl je i u volání hodnot. U starších kalkulaček je častější přímé volání

hodnot po stisku klávesy SHIFT (většinou bez nutnosti mačkat =), nejnovější kalkulačky naopak nemají dvě klávesy S-SUM a S-VAR, ale jedinou STAT, která otevře menu, ze kterého se vybírají podmenu SUM, VAR,....

Př. 1: Urči pomocí kalkulačky všechny statistické veličiny, které dokáže určit tvá kalkulačka pro: a) známku z matematiky b) hmotnost studenta.

a) známku z matematiky

$$n = 19, \sum x = 53, \sum x^2 = 159, \bar{x} = 2,789473684, \delta_n = 0,766327356, \delta_{n-1} = 0,787326514$$

b) hmotnost studenta

$$n = 19, \sum x = 1225, \sum x^2 = 80789, \bar{x} = 64,47368421, \delta_n = 9,756878389,$$

$$\delta_{n-1} = 10,02423963$$

Normální statistický mód neumožňuje najednou sledovat dvě veličiny. Některé kalkulačky umožňují tyto výpočty pomocí módu regresní analýzy (nejčastěji REG), pro korelační koeficient v našem pojetí musíme ještě zvolit její lineární typ (snažíme se najít funkční vztah $y = Ax + B$).

Pedagogická poznámka: V tomto módu kalkulačka hledá mezi veličinami závislosti ve tvaru $y = Ax + B$. Ostatní módy fungují principiálně stejně, ale předpokládají jiný tvar funkční závislosti.

Otestujeme na zpracování dat:

x	2,1	2,2	2,2
y	6,2	6,4	6,5

Příklad na kalkulačce CASIO fx-570MS

1. přepneme do statistického módu RG, Lin a vynulujeme paměť

- přepnutí do statistického módu RG: MODE, MODE, 1, 1
- vynulování paměti: SHIFT, CLR, 1, =

2. zadáme hodnoty, ze kterých potřebujeme zjistit statistické údaje

- zadávání dat (sledujeme závislost dvou veličin \Rightarrow musíme je zadávat v párech \Rightarrow na jeden stiskl klávesy DT musíme zadat dvě hodnoty \Rightarrow používáme oddělovač dvou hodnotu – klávesu “,“): 2.1,6.2 DT 2.2,6.4 DT 2.2,6.5 DT.

Hodnoty jsou uloženy v kalkulačce \Rightarrow můžeme se tázat na statistické veličiny.

3. pomocí tlačítek vyvoláváme hodnoty statistických veličin

Statistické veličiny jsou často rozděleny do dvou skupin

S-SUM (volíme je takto: první tři veličiny: SHIFT, S-SUM, 1(2, 3), =, druhé tři veličiny:

SHIFT, S-SUM, \rightarrow , 1(2, 3), =):

- počet záznamů n ($n = 3$)
- součet hodnot prvků souboru $\sum x$ ($\sum x = 6,5$)
- součet druhých mocnin prvků souboru $\sum x^2$ ($\sum x^2 = 14,09$)
- součet hodnot prvků souboru $\sum y$ ($\sum y = 19,1$)
- součet druhých mocnin prvků souboru $\sum y^2$ ($\sum y^2 = 121,65$)
- součet součinů $\sum xy$ ($\sum xy = 41,4$)

S-VAR

Veličiny popisující proměnnou x (volíme je takto: SHIFT, S-VAR, 1(2, 3), =):

- aritmetický průměr \bar{x} ($\bar{x} = 2,16666667$),
- směrodatná odchylka s_x (častěji značená δ_n , $\delta_n = 0,047140452$),
- výběrová směrodatná odchylka δ_{n-1} ($\delta_{n-1} = 0,057735026$).

Veličiny popisující proměnnou y (volíme je takto: SHIFT, S-VAR, \rightarrow , 1(2, 3), =):

- aritmetický průměr \bar{y} ($\bar{y} = 6,36666667$),
- směrodatná odchylka s_x (častěji značená δ_n , $\delta_n = 0,124721912$),
- výběrová směrodatná odchylka δ_{n-1} ($\delta_{n-1} = 0,152752523$).

Veličiny popisující vztah obou proměnných (volíme je takto: SHIFT, S-VAR, \rightarrow , \rightarrow , 1(2, 3), =):

- regresní koeficient A ($A = 0,95000000001$),
- regresní koeficient B ($B = 2,49999999999$),
- korelační koeficient r ($r = 0,944911182$).

Př. 2: Urči pomocí kalkulačky korelaci mezi:

- a) velikostí studentů a jejich hmotností,
- b) známkou z matematiky a známkou z fyziky.

a) korelace mezi velikostí studentů a jejich hmotností

$$\bar{x} = 175,157895 \quad \delta_n = 7,19109945$$

$$\bar{y} = 64,47368 \quad \delta_n = 9,756878$$

$$r = 0,61404583$$

b) korelace mezi známkou z matematiky a známkou z fyziky

$$\bar{x} = 2,789473684 \quad \delta_n = 0,766327357$$

$$\bar{y} = 2,631578947 \quad \delta_n = 0,740591962$$

$$r = 0,697968$$

Shrnutí: Pokud přepneme kalkulačku do statistického módu a zadáme zkoumané hodnoty, můžeme se snadno dotazovat na statistické veličiny.