


### 10.3.14 Výpočet plochy obrazce II

**Předpoklady:** 10313


Pomocí integrálů můžeme počítat i obsahy ploch, které nejsou vůbec ohraničovány osou  $x$ .



Obsah červené plochy na obrázku určíme pomocí integrálu takto:


$$S = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx.$$

Proč je jasné z obrázku:




- Modrá plocha  $S = \int_a^b f(x) dx$
- Šrafovaná plocha  $S = \int_a^b g(x) dx$

Vzorec platí i v případě, že alespoň jedna z funkcí nabývá záporných hodnot, protože přičtením vhodné konstanty k oběma funkcím se plocha mezi křivkami nezmění, pouze se obrázek posune dostatečně nahoru



**Př. 1:** Urči obsah rovinného obrazce, který ohraničují křivky  $y = 2^x$ ,  $y = x$ ,  $x = -2$ ,  $x = 1$ .

Nakreslíme si přibližné tvary grafů obou funkcí:




Obsah plochy:

$$S = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx = \int_{-2}^1 (2^x - x) dx = \left[ \frac{2^x}{\ln 2} \right]_{-2}^1 - \left[ \frac{x^2}{2} \right]_{-2}^1 = \frac{1}{\ln 2} (2^1 - 2^{-2}) - \frac{1}{2} [1^2 - (-2)^2] =$$

$$= \frac{1}{\ln 2} \left( 2 - \frac{1}{4} \right) - \frac{1}{2} (-3) = \frac{7}{4 \ln 2} + \frac{3}{2}$$

V mnoha případech se v zadání přímo neudávají meze, protože ohraničenou plochu omezuje přímo tvar křivek:




**Př. 2:** Urči obsah útvaru, který je ohraničen křivkami:

a)  $y = \sqrt{x}$ ,  $y = x^2$       b)  $y = x^2 - 3$ ,  $y = 2x$

a)  $y = \sqrt{x}$ ,  $y = x^2$

Obě funkce procházejí body  $[0;0]$  a  $[1;1]$ .



$$S = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx = \int_0^1 (\sqrt{x} - x^2) dx = \left[ \frac{x^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} - \left[ \frac{x^3}{3} \right]_0^1 \right]_0^1 = \frac{2}{3} \left[ \sqrt{x^3} \right]_0^1 - \frac{1}{3} \left[ x^3 \right]_0^1 =$$

$$= \frac{2}{3} (\sqrt{1^3} - \sqrt{0^3}) - \frac{1}{3} (1^3 - 0^3) = \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$$


b)  $y = x^2 - 3$ ,  $y = 2x$

Nejdříve určíme meze integrálu, tedy společné body grafů obou funkcí:

$$x^2 - 3 = 2x$$

$$x^2 - 2x - 3 = (x - 3)(x + 1) = 0 \Rightarrow x_1 = -1, x_2 = 3$$


$\Rightarrow$  oba grafy se protínají v bodech  $[-1; -2]$  a  $[3; 6]$



$$\begin{aligned}
 S &= \int_a^b [f(x) - g(x)] dx = \int_{-1}^3 [2x - (x^2 - 3)] dx = \int_{-1}^3 (2x - x^2 + 3) dx = \\
 &= \left[ 2 \frac{x^2}{2} \right]_{-1}^3 - \left[ \frac{x^3}{3} \right]_{-1}^3 + [3x]_{-1}^3 = [3^2 - (-1)^2] - \left[ \frac{3^3}{3} - \frac{(-1)^3}{3} \right] + [3 \cdot 3 - 3(-1)] = \\
 &= (9 - 1) - \left( 9 + \frac{1}{3} \right) + (9 + 3) = \frac{32}{3}
 \end{aligned}$$

Pokud je útvar ohraničen větším počtem křivek rozdělíme počítání integrálu na více částí podobně jako v minulé hodině, když křivka protínala osu  $x$  a části obrazce se vyskytovali střídavě nad i pod osou  $x$ .


**Př. 3:** Zapiš obecný vztah pro výpočet plochy vyznačené na obrázku ohraničené funkcemi  $y = f(x)$ ,  $y = g(x)$  a  $y = h(x)$ .



$$S = \int_a^c [h(x) - g(x)] dx + \int_c^b [f(x) - g(x)] dx$$

**Př. 4:** Vypočti obsah útvaru, který je zespodu ohraničen křivkou  $y = x^2$  a seshora přímkami funkcí  $y = 0,5x + 5$  a  $y = -4x + 5$ .

Nakreslíme si obrázek situace:



Hledáme průsečíky:

funkce  $y = x^2$  a  $y = 0,5x + 5 \Rightarrow x^2 = 0,5x + 5$

$$2x^2 - x - 10 = 0$$

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-(-1) \pm \sqrt{(-1)^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-10)}}{2 \cdot 2} = \frac{1 \pm 9}{4}$$

$$x_1 = \frac{1+9}{4} = \frac{5}{2} \quad x_2 = \frac{1-9}{4} = -2 \text{ - tento bod nás zajímá}$$

funkce  $y = x^2$  a  $y = -4x + 5 \Rightarrow x^2 = -4x + 5$

$$x^2 + 4x - 5 = (x+5)(x-1) = 0$$


$$x_1 = -5 \quad x_2 = 1 \text{ - tento bod nás zajímá}$$

$\Rightarrow$  pro obsah útvaru platí:

$$\begin{aligned} S &= \int_{-2}^0 [(0,5x+5) - x^2] dx + \int_{-2}^1 [(5-4x) - x^2] dx = \int_{-2}^0 (0,5x+5-x^2) dx + \int_{-2}^1 (5-4x-x^2) dx = \\ &= \frac{1}{2} \left[ \frac{x^2}{2} \right]_{-2}^0 + 5[x]_{-2}^0 - \left[ \frac{x^3}{3} \right]_{-2}^0 + 5[x]_{-2}^1 - 4 \left[ \frac{x^2}{2} \right]_{-2}^1 - \left[ \frac{x^3}{3} \right]_{-2}^1 = \\ &= \frac{1}{2} \left[ \frac{0^2}{2} - \frac{(-2)^2}{2} \right] + 5[0 - (-2)] - \left[ \frac{0^3}{3} - \frac{(-2)^3}{3} \right] + 5(1-0) - 4 \left( \frac{1^2}{2} - \frac{0^2}{2} \right) - \left( \frac{1^3}{3} - \frac{0^3}{3} \right) = \\ &= -1 + 10 - \left( \frac{8}{3} \right) + 5 - 2 - \frac{1}{3} = 9 \end{aligned}$$

**Pedagogická poznámka:** Následující příklad nemohou studenti samozřejmě počítat samostatně. Je zařazen spíše jako ukázka toho, jak se počítají trochu těžší integrály.

**Př. 5:** Odvoď pomocí integrálu vztah pro obsah kruhu  $r$ .



Rovnice kružnice s poloměrem  $r$  a středem v bodě  $S[0;0]$ :  $x^2 + y^2 = r^2$

Upravíme do tvaru předpisu funkce:  $y = \sqrt{r^2 - x^2}$ .

Obsah plochy:  $S = \int_0^r f(x) dx = \int_0^r \sqrt{r^2 - x^2} dx$  - takový integrál spočítat neumíme

**Trik:** substituce  $x = r \sin t$  (zdánlivě obrácený postup než normálně – substitucí si výraz zesložitějeme)  $\Rightarrow dx = r \cos t dt$

ještě musíme změnit meze:

- $x = 0 = r \sin t \Rightarrow \sin t = 0 \Rightarrow t = 0$
- $x = r = r \sin t \Rightarrow \sin t = 1 \Rightarrow t = \frac{\pi}{2}$

$$S = \int_0^r f(x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{r^2 - r^2 \sin^2 t} r \cos t dt = r \int_0^{\frac{\pi}{2}} r \sqrt{1 - \sin^2 t} \cos t dt = r^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos t \cdot \cos t dt = r^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t dt$$

Použijeme vzorec pro poloviční úhel:  $\cos \frac{x}{2} = \sqrt{\frac{1 + \cos x}{2}} \Rightarrow \cos^2 t = \frac{1 + \cos 2t}{2}$

$$S = \int_0^r f(x) dx = r^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t dt = r^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 + \cos 2t}{2} dt = \frac{r^2}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} 1 dt + \frac{r^2}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos 2t dt = \frac{r^2}{2} [t]_0^{\frac{\pi}{2}} + \frac{r^2}{2} \cdot \frac{1}{2} [\sin 2t]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{r^2}{2} \left( \frac{\pi}{2} - 0 \right) + \frac{r^2}{4} (\sin \pi - \sin 0) = \frac{\pi r^2}{4}$$

Spočtený obsah je pouze čtvrtinou obsahu celého kruhu  $\Rightarrow$  obsah kruhu je dán vztahem

$$S = \pi r^2.$$

**Př. 6:** Petáková:  
strana 165/cvičení 100 a) h)

**Shrnutí:**