

### 1.3.1 Početní příklady - rovnoměrný pohyb


**Předpoklady:** 010112

**Pedagogická poznámka:** Do následujících hodin před vlastním pohybem po kružnici jsou přesunuty příklady na rovnoměrný a rovnoměrně zrychlený pohyb, které vyžadují úpravy rovnic a práci s neznámými. V této době už by žáci měli mít probránu úvodní kapitolu matematiky a s ní úpravy výrazů a vyjadřování ze vzorce. Matematika by tak neměla být zásadní překážkou, která jim brání v úspěšném řešení příkladů. Pokud přesto nebudou schopni příklady matematicky zvládnout, doporučuji hodiny přeskočit a přiměřeně ořezat i následující hodiny o kruhovém pohybu (vyřadit příklady, ve kterých se využívá celá soustava rovnic a dosazuje se z jedné rovnice do druhé). Na druhé straně je potřeba (bez ohledu na úroveň matematiky) dosáhnout toho, aby vyjadřování z běžných vzorců žákům problémy nečinilo a žáci kvůli potížím s vyjadřováním neměli pocit, že jim nejde fyzika.

**Pedagogická poznámka:** Přesun na toto místo byl zvolen kromě ohledů na výuku matematiky i kvůli tomu, aby si žáci zopakovali rovnice pro pohyby a lépe pak přijali analogii přímočarého pohybu s pohybem po kružnici.

**Pedagogická poznámka:** Cílem hodiny je nácvik využití matematického formalismu, proto není uvedeno řešení příkladů různými druhy úvah, které matematický formalismus do různé míry obcházejí. Pokud někdo s takovým řešením přijde, zaslouží pochvalu, ale přesto by měl využití matematiky zkusit. Hledání takových řešení je pak docela pěkný dobrovolný domácí úkol.

**Př. 1:** Turista vyrazil na výlet do vedlejšího města pomalou chůzí 3 km/h. Po hodině chůze si vzpomněl, že zapomněl peněženku, a začal se rychle rychlostí 6 km/h vracet zpět. Doma popadl peněženku a pospíchal v původním směru stále rychlostí 6 km/h, dokud se mu nepodařilo dohnat původní ztrátu. Nakresli do jednoho obrázku graf jeho pohybu i graf pohybu, který by platil, pokud by nezapomněl peněženku a šel stále stejnou rychlostí. Z grafu zjistí, za jak dlouho by dohnal ztrátu, a odhad ověř výpočtem.



Zelená přerušovaná čára: pohyb turisty, který si nic nezapomněl. Jde stále rychlostí 3 km/h a za pět hodin ujde 15 km.

Červená čára: graf turisty, který si zapomněl peněženku. Po jedné hodině se začne vracet zpět, po půlhodině je doma a pak každou další hodinu ujde 6 km, dokud nedožene ztrátu. Pak opět zpomalí na 3 km/h.

V místě, kde se obě čáry protínají, zapomnětlivý turista dožene toho, který nic nezapomněl. Turista dožene plán po třech hodinách po začátku.

Ověření výpočtem:

Zelený turista jde tři hodiny rychlostí 3 km/h. Ujde tedy  $s = vt = 3 \cdot 3 \text{ km} = 9 \text{ km}$ .

Červený turista se pohybuje, jako by vyrážel v 1,5 hodině. Do okamžiku setkání jde tedy jenom 1,5 hodiny rychlostí 6 km/h. Ujde tedy  $s = vt = 6 \cdot 1,5 \text{ km} = 9 \text{ km}$ .

Obě vzdálenosti jsou stejné  $\Rightarrow$  turista dožene svůj plán ve 3. hodině.

Jak bychom postupovali, kdyby se grafy neprotnuly přesně ve třetí hodině?

Ve chvíli, kdy turista dožene ztrátu, musí platit: dráha plánovaná = dráha skutečná.

$$s_p = s_s$$

Obě dráhy jsou dráhy rovnoměrného pohybu  $\Rightarrow s_p = v_p t_p, s_s = v_s t_s$ .

$$v_p t_p = v_s t_s$$

Platí:  $t_s = t_p - 1,5$  (Turista ve skutečnosti vyrazil z domova po návratu o 1,5 hodiny později, než plánoval).

Dosadíme za rychlosti:  $3t_p = 6(t_p - 1,5)$  (dále píšeme místo  $t_p$  jenom  $t$ )

$$3t = 6t - 9$$

$$3t = 9$$

$$t = 3$$

**Př. 2:** Petr s Hankou šli společně na výlet. V Kutimovicích potkal Petr svého kamaráda a řekl sestře, aby šla dál, že ji dohoní. Kdy a kde ji dohonil, když z Kutimovic vyrazil o půl hodiny později a pospíchal rychlostí 8 km/h, zatímco sestra pokračovala pomalou chůzí 4 km/h? Příklad řeš: a) úvahou b) sestavením rovnice.

a) úvahou

Hanka vyjde z Kutimovic dříve než její bratr. Získá tak náskok, který její bratr musí dohonit.

Hanka se pohybuje půl hodiny rychlostí 4 km/h  $\Rightarrow$  získá náskok dva kilometry. Bratr ji dohání rychlostí 4 km/h (rozdíl rychlosti Petra a Hanky)  $\Rightarrow$  náskok dožene za

$$t = \frac{s}{v} = \frac{2}{4} \text{ h} = 0,5 \text{ h}.$$

b) pomocí rovnice

$s_H = s_P$  (oba sourozenci ve chvíli setkání urazili z Kutimovic stejnou vzdálenost)

$v_H t_H = v_P t_P$  (oba sourozenci se pohybovali rovnoměrně)

Stále máme dvě neznámé veličiny. Petr vyrazil z Kutimovic o půl hodiny později než Hanka, která tedy šla o půl hodiny déle a tak platí:  $t_H = t_P + 0,5$ , dosadíme:

$v_H(t_P + 0,5) = v_P t_P$  (v rovnici známe všechny členy kromě  $t_P$ , které z ní můžeme vyjádřit)

$$v_H t_P + 0,5 v_H = v_P t_P$$

$$0,5 v_H = v_P t_P - v_H t_P$$

$$0,5 v_H = (v_P - v_H) t_P$$

$$t_P = \frac{0,5 v_H}{(v_P - v_H)}$$

Provedeme kontrolu správnosti našeho řešení. Na levé straně rovnice je čas, výraz na pravé straně rovnice musí mít také význam času. A opravdu ho má, na pravé straně je zlomek, v jehož čitateli je výraz  $0,5 v_H$ , který má význam dráhy (0,5 je půlhodina Hančina náskoku), a

v jehož jmenovateli je rozdíl rychlostí, tedy zase nějaká rychlost. Podíl  $\frac{s}{v}$  má opět význam času  $\Rightarrow$  výsledný vztah může být správně.

$$t_p = \frac{0,5v_H}{(v_p - v_H)} = \frac{0,5 \cdot 4}{8 - 4} \text{ h} = 0,5 \text{ h}$$

$$s_p = v_p t_p = 8 \cdot 0,5 \text{ km} = 4 \text{ km}$$

Petr dohnal Hanku za půl hodiny ve vzdálenosti 4 km od Kutimovic.

**Dodatek:** Ve skutečnosti jsme dvěma různými způsoby získali stejné výsledky. Protože čítec zlomku  $0,5v_H$  je vlastně Hančin náskok a rozdíl  $v_p - v_H$  je rychlost, kterou Petr Hanku doháněl.

**Poznámka:** Trochu manuálnější typem této kontroly výsledného vztahu je „rozměrová zkouška“. Do výrazu vpravo dosadíme za jednotlivé veličiny jejich jednotky. Po úpravě musí

vyjít jednotky veličiny na levé straně.  $\frac{0,5v_H}{(v_p - v_H)} = \frac{\text{h} \cdot \frac{\text{km}}{\text{h}}}{\frac{\text{km}}{\text{h}}} = \text{h}$ . Čas se měří v hodinách,

zkouška tedy vyšla.

**Poznámka:** Důležité je si uvědomit, že pokud „rozměrová zkouška“ vyjde, neznamená to, že výsledek je správný. Pouze, když nevyjde, víme, že výsledek je špatně.

Rozměrovou zkoušku nemusíme provádět pouze u konečného výrazu. Můžeme ji použít i pro hledání chyby v kterémkoliv místě výpočtu. Například také v rovnici  $0,5v_H = v_p t_p - v_H t_p$ , musejí mít (a také mají) všechny členy stejný význam dráhy.

**Dodatek:** Jinak postup obecného řešení není jediný ani jednoznačný. Mohli bychom postupovat i takto:

$$s_H = s_p$$

$$v_H t_H = s_p$$

$$v_H (t_p + 0,5) = s_p$$

$$v_H \left( \frac{s_p}{v_p} + 0,5 \right) = s_p \text{ a nyní vyjádřit } s_p \dots\dots$$

**Př. 3:** Traktor a auto vyjedou současně proti sobě po přímé silnici. Počáteční vzdálenost obou vozidel je 15 km, obě vozidla jedou stálou rychlostí. Rychlost traktoru je 36 km/h, rychlost auta je 20 m/s. Za jakou dobu a kde se obě vozidla potkají?

$$v_t = 10 \text{ m/s} \quad v_a = 20 \text{ m/s} \quad t = ? \quad s = 15 \text{ km} = 15000 \text{ m}$$

Ve chvíli, kdy se obě vozidla potkají, urazí dohromady od počátečního okamžiku vzdálenosti 15 km (jejich počáteční vzdálenost)  $\Rightarrow s = s_t + s_a$ .

$$s = v_t t + v_a t$$

$$s = (v_t + v_a) t$$

$$t = \frac{s}{v_t + v_a} = \frac{15000}{10 + 20} \text{ s} = 500 \text{ s}$$

$$s_t = v_t t = 10 \cdot 500 \text{ m} = 5000 \text{ m}$$

Vozidla se potkají za 500 sekund (8,3 minuty) ve vzdálenosti 5 km od místa, ze kterého vyjížděl traktor.

- Př. 4:**
- Osobní automobil předjíždí v obci rychlostí 50 km/h traktor pomalu jedoucí rychlostí 30 km/h. Jakou vzdálenost ujede od okamžiku, kdy začne předjíždět, do chvíle, kdy se bezpečně zařadí před traktor, jestliže traktor s valníkem je dlouhý 12 m a auto musí začít předjíždět 10 m před koncem traktoru a zařadit se 10 m před něj. Nejdříve odvoď obecný vzorec a pak s jeho pomocí vyřeš i další zadání.
  - Osobní automobil porušuje předpisy a jede uvnitř obce rychlostí 60 km/h.
  - Osobní automobil jedoucí rychlostí 90 km/h předjíždí nákladní automobil o délce 16 m jedoucí rychlostí 75 km/h.
  - Osobní automobil jedoucí rychlostí 130 km/h předjíždí na dálnici nákladní automobil o délce 16 m jedoucí rychlostí 100 km/h. Protože přejíždění probíhá ve větší rychlosti, musí osobní automobil odbočovat už ve vzdálenosti 15 m a ve stejné vzdálenosti se i zařazovat před předjížděné vozidlo.  
Do odvozeného vzorce dosazuj tak, aby si převáděl co nejmenší počet hodnot.

Předjíždějící vozidlo značíme indexem  $r$  (rychlejší), předjížděné vozidlo indexem  $p$  (pomalejší).

Během předjíždění ujede rychlejší automobil vzdálenost, která je o  $\Delta s$  (v bodě a) platí  $\Delta s = 10 + 12 + 10 \text{ m}$ ) delší než vzdálenost, kterou ujede pomalejší vozidlo:  $s_r = s_p + \Delta s$ .

Dosadíme  $s = vt$ :  $v_r t_r = v_p t_p + \Delta s$ .

Předjíždění trvá pro oba automobily stejně dlouho:  $t_r = t_p = t$ :  $v_r t = v_p t + \Delta s$ .

V rovnici zbyla jediná neznámá - čas předjíždění  $t \Rightarrow$  vyjádříme ho.

$$v_r t - v_p t = \Delta s$$

$$t(v_r - v_p) = \Delta s$$

$$t = \frac{\Delta s}{v_r - v_p}$$

Hledáme vzdálenost, kterou ujede rychlejší vozidlo:  $s_r = v_r t = \frac{v_r \cdot \Delta s}{v_r - v_p} = \Delta s \cdot \frac{v_r}{v_r - v_p}$ .

Zlomek obsahuje v čitateli i jmenovateli pouze rychlost  $\Rightarrow$  hodnotou zlomku je bezrozměrná veličina  $\Rightarrow$  pokud dosadíme všechny rychlosti ve stejné jednotce, násobky základních jednotek se vykrátí a výsledek získáme ve stejné jednotce, ve které jsme dosadili  $\Delta s$ .

a) Osobní automobil předjíždí v obci rychlostí 50 km/h traktor pomalu jedoucí rychlostí 30 km/h. Jakou vzdálenost ujede od okamžiku, kdy začne předjíždět, do chvíle, kdy se bezpečně zařadí před traktor, jestliže traktor s valníkem je dlouhý 12 m a auto musí začít předjíždět 10 m před koncem traktoru a zařadit se 10 m před něj.

$$v_r = 50 \text{ km/h}, v_p = 30 \text{ km/h}, \Delta s = 10 + 12 + 10 \text{ m} = 32 \text{ m}$$

$$s_r = \Delta s \cdot \frac{v_r}{v_r - v_p} = 32 \cdot \frac{50}{50 - 30} \text{ m} = 80 \text{ m}$$

b) Osobní automobil porušuje předpisy a jede uvnitř obce rychlostí 60 km/h.

$$v_r = 60 \text{ km/h}, v_p = 30 \text{ km/h}, \Delta s = 10 + 12 + 10 \text{ m} = 32 \text{ m}$$

$$s_r = \Delta s \cdot \frac{v_r}{v_r - v_p} = 32 \cdot \frac{60}{60 - 30} \text{ m} = 64 \text{ m}$$

c) Osobní automobil jedoucí rychlostí 90 km/h předjíždí nákladní automobil o délce 16 m jedoucí rychlostí 75 km/h.

$$v_r = 90 \text{ km/h}, v_p = 75 \text{ km/h}, \Delta s = 10 + 16 + 10 \text{ m} = 36 \text{ m}$$

$$s_r = \Delta s \cdot \frac{v_r}{v_r - v_p} = 36 \cdot \frac{90}{90 - 75} \text{ m} = 216 \text{ m}$$

d) Osobní automobil jedoucí rychlostí 130 km/h předjíždí na dálnici nákladní automobil o délce 16 m jedoucí rychlostí 100 km/h. Protože přejíždění probíhá ve větší rychlosti, musí osobní automobil odbočovat už ve vzdálenosti 15 m a ve stejné vzdálenosti se i zařazovat před předjížděné vozidlo.

$$v_r = 130 \text{ km/h}, v_p = 100 \text{ km/h}, \Delta s = 15 + 16 + 15 \text{ m} = 46 \text{ m}$$

$$s_r = \Delta s \cdot \frac{v_r}{v_r - v_p} = 46 \cdot \frac{130}{130 - 100} \text{ m} = 199 \text{ m}$$

**Př. 5:** Romeo a Julie jeli na kolech na společný výlet. Po 5 km Romeo zjistil, že si doma zapomněl mobil. Zrychlil na 20 km/h a začal se pro něj vracet, zatímco Julie zvolnila na 10 km/h a pokračovala v původním směru. Za jak dlouho a kde ji Romeo dohonil, když se doma jenom otočil a hned se vydal stejnou rychlostí 20 km/h za Julii?

$$v_R = 20 \text{ km/h}, v_J = 10 \text{ km/h}, s_d = 5 \text{ km}, t = ?$$

Ve chvíli, kdy Romeo Julii dožene, budou oba stejnou dobu na cestě. Romeo však urazí větší vzdálenost.

$$t_R = t_J$$

$$\frac{s_R}{v_R} = \frac{s_J}{v_J} \quad \text{Romeo kvůli vracení ujede o 10 km více} \Rightarrow s_R = s_J + 10$$

$$\frac{s_J + 10}{v_R} = \frac{s_J}{v_J} \quad / \cdot v_R v_J$$

$$v_J (s_J + 10) = v_R \cdot s_J$$

$$v_J s_J + 10 v_J = v_R \cdot s_J$$

$$10 v_J = v_R s_J - v_J s_J$$

$$10 v_J = (v_R - v_J) s_J$$

$$s_J = \frac{10 v_J}{v_R - v_J} = \frac{10 \cdot 10}{20 - 10} \text{ km} = 10 \text{ km}$$

$$t_J = \frac{s_J}{v_J} = \frac{10}{10} \text{ h} = 1 \text{ h}$$

Romeo dožene Julii po 1 hodině ve vzdálenosti 10 km od místa, kde se rozdělili.

**Pedagogická poznámka:** Další příklady (více matematické) můžete nalézt v hodině 020513 Slovní úlohy o pohybu v učebnici matematiky.

**Shrnutí:** Pokud řešíme příklad sestavením rovnice, vycházíme z rovnosti dvou veličin.

