

## 2.8.17 Záporné mocniny

Předpoklady: 0208016

**Př. 1:** Vypočti. Výsledek vyjádři jako mocninu.

a)  $6^{12} \cdot 6^7$

b)  $\frac{11^{152}}{11^{144}}$

c)  $(2^3)^4$

d)  $\frac{(3^2)^6}{3^7}$

e)  $\frac{2^4}{2^6}$

f)  $3^{n+3} \cdot 3^{2n-1}$

g)  $\frac{2^3 \cdot 2^{n-1}}{2^n}$

h)  $(2^{n+1})^3$

a)  $6^{12} \cdot 6^7 = 6^{12+7} = 6^{19}$

b)  $\frac{11^{152}}{11^{144}} = 11^{152-144} = 11^8$

c)  $(2^3)^4 = 2^{3 \cdot 4} = 2^{12}$

d)  $\frac{(3^2)^6}{3^7} = \frac{3^{2 \cdot 6}}{3^7} = \frac{3^{12}}{3^7} = 3^{12-7} = 3^5$

e)  $\frac{2^4}{2^6} = 2^{4-6} = 2^{-2}$  (co to znamená?)

f)  $3^{n+3} \cdot 3^{2n-1} = 3^{n+3+2n-1} = 3^{3n+2}$

g)  $\frac{2^3 \cdot 2^{n-1}}{2^n} = 2^{3+n-1-n} = 2^2$

h)  $(2^{n+1})^3 = 2^{(n+1) \cdot 3} = 2^{3n+3}$

**Pedagogická poznámka:** Nejdůležitější je bod e). Jeho řešení vyvolá diskusi, která poté vede k zavedení záporného mocnitele.

Bod e) v předchozím příkladu:  $\frac{2^4}{2^6} = 2^{4-6} = 2^{-2}$ .

Co to znamená? Nemůžeme přece opakovat násobení číslem 2 -2krát.

Rozepíšeme mocniny ve zlomku:  $\frac{2^4}{2^6} = \frac{2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2}{2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2} = \frac{1}{2 \cdot 2} = \frac{1}{2^2}$ .

Zdá se, že platí:  $2^{-2} = \frac{1}{2^2}$ . Je to rozumné?

- Dělení je opačná operace k násobení.
- Když zmenšíme exponent o jedna, ubude jedno číslo, které násobíme (jako bychom měli mocninu napsanou ve zlomku a přidali jedno násobení číslem do jmenovatele):
  - $2^3 = 2 \cdot 2 \cdot 2$
  - $2^2 = \frac{2 \cdot 2 \cdot 2}{2} = 2 \cdot 2$  (předchozí výraz jsme vydělili číslem 2),
  - $2^1 = \frac{2 \cdot 2 \cdot 2}{2 \cdot 2} = 2$  (předchozí výraz jsme vydělili číslem 2),
  - $2^0 = \frac{2 \cdot 2 \cdot 2}{2 \cdot 2 \cdot 2} = 1$  (předchozí výraz jsme vydělili číslem 2),
  - $2^{-1} = \frac{2 \cdot 2 \cdot 2}{2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2} = \frac{1}{2}$  (předchozí výraz jsme vydělili číslem 2),

- $2^{-2} = \frac{2 \cdot 2 \cdot 2}{2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2} = \frac{1}{2 \cdot 2} = \frac{1}{2^2}$  (předchozí výraz jsme vydělili číslem 2).
- zavedení záporného mocnitele je logickým pokračování řady.

**Pro každé reálné číslo  $a$  různé od nuly, platí  $a^0 = 1$ .**

**Pro každé reálné číslo  $a$  různé od nuly, každé celé číslo  $z$  platí  $a^{-z} = \frac{1}{a^z}$ .**

**Př. 2:** Vypočti tak, aby výsledek neobsahoval mocninu.

a)  $3^{-2}$       b)  $2^{-5}$       c)  $10^{-3}$       d)  $11^{-2}$       e)  $(\sqrt{2})^{-2}$       f)  $(\sqrt[3]{3})^{-3}$

a)  $3^{-2} = \frac{1}{3^2} = \frac{1}{9}$       b)  $2^{-5} = \frac{1}{2^5} = \frac{1}{32}$       c)  $10^{-3} = \frac{1}{10^3} = \frac{1}{1000}$

d)  $11^{-2} = \frac{1}{11^2} = \frac{1}{121}$       e)  $(\sqrt{2})^{-2} = \frac{1}{(\sqrt{2})^2} = \frac{1}{2}$       f)  $(\sqrt[3]{3})^{-3} = \frac{1}{(\sqrt[3]{3})^3} = \frac{1}{3}$

**Př. 3:** Vyjádři mocniny deseti jako desetinná čísla.

a)  $10^{-2}$       b)  $10^{-5}$       c)  $10^{-1}$       d)  $10^{-9}$       e)  $10^{-4}$

a)  $10^{-2} = \frac{1}{10^2} = \frac{1}{100} = 0,01$       b)  $10^{-5} = \frac{1}{10^5} = \frac{1}{100\,000} = 0,000\,01$

c)  $10^{-1} = \frac{1}{10} = 0,1$       d)  $10^{-9} = \frac{1}{10^9} = \frac{1}{1\,000\,000\,000} = 0,000\,000\,001$

e)  $10^{-4} = \frac{1}{10^4} = \frac{1}{10\,000} = 0,000\,1$

**Pedagogická poznámka:** Rozhodně není nutné, aby žáci rozepisovali celý postup tak, jak je uvedeno v učebnici. Naopak čím dřív poznají, že výsledky mohou psát z hlavy, tím lépe.

**Př. 4:** Zapiš čísla jako mocniny deseti. Jakým způsobem určuješ mocnitele?

a) 100      b) 0,001      c) 0,000 01      d) 100 000 000      e) 0,000 000 001

a)  $100 = 10^2$       b)  $0,001 = 10^{-3}$       c)  $0,000\,01 = 10^{-5}$

d)  $100\,000\,000 = 10^8$       e)  $0,000\,000\,001 = 10^{-9}$

Pokud jde o číslo větší než jedna odpovídá mocnitel počtu nul čísla. Pokud je číslo menší než 1 odpovídá záporný mocnitel počtu desetinných míst.

**Př. 5:** Vypočti.

a)  $2^{-3}$       b)  $4^{-2}$       c)  $1^{-15}$       d)  $3^{-4}$       e)  $7^{-1}$       f)  $13^{-2}$

a)  $2^{-3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}$

b)  $4^{-2} = \frac{1}{4^2} = \frac{1}{16}$

c)  $1^{-15} = \frac{1}{1^{15}} = \frac{1}{1} = 1$

d)  $3^{-4} = \frac{1}{3^4} = \frac{1}{81}$

e)  $7^{-1} = \frac{1}{7}$

f)  $13^{-2} = \frac{1}{13^2} = \frac{1}{169}$

**Př. 6:** Vypočti.

a)  $\left(\frac{1}{2}\right)^{-2}$       b)  $\left(\frac{1}{3}\right)^{-3}$       c)  $\left(\frac{1}{100}\right)^{-2}$       d)  $\left(\frac{3}{4}\right)^{-1}$

a)  $\left(\frac{1}{2}\right)^{-2} = \frac{1}{\left(\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{1}{\frac{1}{4}} = 4$

b)  $\left(\frac{1}{3}\right)^{-3} = \frac{1}{\left(\frac{1}{3}\right)^3} = \frac{1}{\frac{1}{27}} = 27$

c)  $\left(\frac{1}{100}\right)^{-2} = \frac{1}{\left(\frac{1}{100}\right)^2} = \frac{1}{\frac{1}{10\,000}} = 10\,000$

d)  $\left(\frac{3}{4}\right)^{-1} = \frac{1}{\frac{3}{4}} = \frac{4}{3}$

Zajímavý postřeh z předchozích příkladů: záporná mocnina obrací zlomky. V příkladu 5 se čísla z čitatele dostala do jmenovatelů, v příkladu 6 se naopak z jmenovatele přesunula do čitatele. V bodu 6 d) se pak číslo ve zlomku prohodila.

**Př. 7:** V kapitole o zlomcích jsme se setkali s převrácenými čísly ( $2$  a  $\frac{1}{2}$ , ...). Zapiš převrácené číslo k číslu  $a$  pomocí mocniny.

Převrácené číslo k číslu  $a$  je číslo  $\frac{1}{a} = a^{-1} \Rightarrow$  převrácené číslo k číslu je číslo  $a^{-1}$  (což je nejčastější označení převrácené hodnoty na kalkulačkách)

**Př. 8:** Vypočti:

a)  $a^{-3}$ , je-li  $a^3 = 16$ ,

b)  $a^2$ , je-li  $a^{-2} = 7$ ,

c)  $a^{-2}$ , je-li  $a = 5$ ,

d)  $a^4$ , je-li  $a^{-3} = 8$ ,

e)  $a^2$ , je-li  $a^{-4} = 36$ ,

f)  $a^{-2}$ , je-li  $a^6 = 8$ .

a)  $a^{-3}$ , je-li  $a^3 = 16$ ,       $a^{-3} = \frac{1}{a^3} = \frac{1}{16}$ .

b)  $a^2$ , je-li  $a^{-2} = 7$ ,       $a^{-2} = 7 \Rightarrow a^{-1} = \sqrt{7} \Rightarrow a = \frac{1}{\sqrt{7}} \Rightarrow a^2 = \frac{1}{\sqrt{7}^2} = \frac{1}{7}$ .

c)  $a^{-2}$ , je-li  $a = 5$ ,  $a^{-2} = 5^{-2} = \frac{1}{5^2} = \frac{1}{25}$ .

d)  $a^4$ , je-li  $a^{-3} = 8$ ,  $a^{-3} = 8 \Rightarrow a^{-1} = \sqrt[3]{8} = 2 \Rightarrow a = \frac{1}{2} \Rightarrow a^4 = \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1}{16}$ .

e)  $a^2$ , jeli  $a^{-4} = 36$ ,  $a^{-4} = 36 \Rightarrow a^{-2} = \sqrt{36} = 6 \Rightarrow a^2 = \frac{1}{6}$ .

f)  $a^{-2}$ , jeli  $a^6 = 8$ ,  $a^6 = 8 \Rightarrow a^2 = \sqrt[3]{8} = 2 \Rightarrow a^{-2} = \frac{1}{2}$ .

**Shrnutí:** Mocnitelem může být i záporné číslo. Platí  $2^{-3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}$ .