


3.3.5 Využití Thaletovy věty, vzájemná poloha kružnic

Předpoklady: 030304


Př. 1: Narýsuj libovolný pravoúhlý trojúhelník. Sestroj co nejrychleji kružnici tomuto trojúhelníku opsanou.




Stačí, když najdeme střed přepony AC , kružnice se středem S_{AC} , procházející body A a C musí procházet i bodem B (podle Thaletovy věty).

Př. 2: Je dána (tzn. je narýsována) úsečka AB , $|AB| = 8 \text{ cm}$. Narýsuj bod C tak, aby trojúhelník ABC byl pravoúhlý s pravým úhlem při vrcholu C a platilo $|AC| = b = 7 \text{ cm}$. Protože úsečka AB je dána, musíš ji narýsovat jako první.

Náčrtek:



Narýsujeme úsečku AB (musí být první). Bod C musí ležet na kružnici $k(A; b = 7 \text{ cm})$. Ještě musíme využít informaci o pravém úhlu ACB (a zjistit, kde na kružnici k bod C leží). Úhel ACB je pravý \Rightarrow musí ležet na Thaletově kružnici nad průměrem AB .




1. $AB; |AB| = c = 8 \text{ cm}$
2. $S; |SA| = |SB|; S \in AB$
3. $t(S; |SA|)$
4. $k(A; b = 7 \text{ cm})$
5. $C = k \cap t$
6. $\triangle ABC$

Dodatek: Thaletova kružnice nad průměrem AB se často označuje pomocí řeckého písmene τ jako τ_{AB} .

Př. 3: Je dána kružnice $k(S; 4 \text{ cm})$ a bod A , $|SA| = 6 \text{ cm}$. Sestroj tečny kružnice k z bodu A .

Postup známe z minulé hodiny, využijeme Thaletovu kružnici nad průměrem SA .




Př. 4: Najdi způsob, jak pomocí pravoúhlého trojúhelníku bez kružítka "narýsovat" kružnici (s vhodným poloměrem).

Využijeme Thaletovu větu (vrchol C pravoúhlého trojúhelníku s přeponou AB leží na kružnici s průměrem AB).


Narýsujeme úsečku AB .

Nastavíme trojúhelník tak, aby jeho odvěsny procházely body $A, B \Rightarrow$ vrchol trojúhelníku proti přeponě musí ležet na kružnici s průměrem $AB \Rightarrow$ vyznačíme tento bod.


Trojúhelník postupně natáčíme a vyznačujeme polohy vrcholu proti přeponě.




Př. 5: Thaletovu větu je možné dokázat i s využitím bodu, který je s bodem C středově souměrný se středem souměrnosti ve středu kružnice. Zkus dokončit tento důkaz.




Potřebujeme určit velikost úhlu ACB . Bod C leží na kružnici $k \Rightarrow$ obraz tohoto bodu ve středové souměrnosti se středem v bodu S bude také ležet na kružnici $k \Rightarrow$ získáme čtyřúhelník $ACBC'$.



Platí $|AS| = |CS| = |BS| = |C'S| = r \Rightarrow$ úhlopříčky čtyřúhelníku $ACBC'$ jsou shodné a navzájem se půlí.






Čtyřúhelník $ACBC'$ je obdélník nebo čtverec \Rightarrow všechny jeho vnitřní úhly jsou pravé.



Úhel ACB je pravý.

Př. 6: Najdi všechny možnosti vzájemné polohy dvou kružnic o různých poloměrech a zapiš je do tabulky. Které vzdálenosti rozhodují o druhu vzájemné polohy?


	<p>Kružnice k_1 leží uvnitř kružnice k_2.</p>
	<p>Kružnice k_1 má vnitřní dotyk s kružnicí k_2.</p>

	<p>Kružnice k_1 se protíná s kružnicí k_2.</p>
	<p>Kružnice k_1 má vnější dotyk s kružnicí k_2.</p>
	<p>Kružnice k_1 nemá s kružnicí k_2 žádný společný bod (kružnice k_1 leží ve vnější oblasti kružnice k_2).</p>

Pedagogická poznámka: Na úvodní neorganizované kreslení nechávám jen chvíli, pak si zkontrolujeme, kolik možností existuje a bavíme se o tom, jak je co nejsystematičtěji zapsat. Velmi rychle někdo navrhone postupovat s menší kružnicí zevnitř ven (nebo obráceně), což využijeme i v následujícím příkladu.

Př. 7: Vzájemná poloha dvou kružnic $k_1(S_1; r_1)$ a $k_2(S_2; r_2)$ je určena poloměry r_1, r_2 obou kružnic a délkou středné $s = |S_1S_2|$. Najdi všechny možnosti vzájemné polohy dvou kružnic o různých poloměrech a různých středech. Napiš ke každé možnosti v přehledu vzájemné polohy dvou kružnic podmínku, kterou tyto tři velikosti musí splňovat (například pro případ, že kružnice k_1 leží uvnitř kružnice k_2 , platí $s < r_2 - r_1$).

	<p>Kružnice k_1 leží uvnitř kružnice k_2.</p> $s < r_2 - r_1$ <p>(protože $r_2 > s + r_1$)</p>
	<p>Kružnice k_1 má vnitřní dotyk s kružnicí k_2.</p> $s = r_2 - r_1$
	<p>Kružnice k_1 se protíná s kružnicí k_2.</p> $r_2 - r_1 < s < r_2 + r_1$ <p>(nejednou platí trojúhelníkové nerovnosti $s < r_1 + r_2$ a $r_2 < s + r_1$)</p>
	<p>Kružnice k_1 má vnější dotyk s kružnicí k_2.</p> $s = r_2 + r_1$



Př. 8: Najdi doma alespoň dvě kola o různém průměru a změř u každého co nejpřesněji:
 a) průměr kola b) obvod kola (délku kružnice).
 Metodu měření zvol tak, aby výsledky byly co nejpřesnější.

Shrnutí: