

3.55.20 Intervaly II

Předpoklady: 030519

Pedagogická poznámka: Soubor se zadáním příkladů je schválně udělaný tak, aby bylo vidět zadání druhého příkladu se zápisem otevřených intervalů. Bystřejší žáci si toho všimnou a způsob zápisu otevřeného intervalu si odvodí sami.

Př. 1: Jana potřebuje určit hmotnost kamene, ale nemá k dispozici váhu. Vzpomněla si však na fyziku a pomocí rovnoramenné páky zjistila, že kámen je těžší než 1 litr vody a lehčí než 1,5 litru vody. Znázorni všechny možné hmotnosti kamene na číselné ose. Zapiš všechny možné hmotnosti kamene.

Kámen může mít všechny hmotnosti větší než 1 kg a menší než 1,5 kg. Je to podobné jako u intervalů v minulé hodině, ale krajní body nepatří mezi čísla, která vyhovují \Rightarrow potřebujeme zápis nového typu intervalu.

Zápis bude zřejmě podobný zápisu uzavřeného intervalu, ale s jiným typem závorek.

Vyznačení na ose bude stejné s tím, že budeme muset nějak vyznačit, že čísla 1 a 1,5 do množiny nepatří (nejlépe prázdným kolečkem).



Množinu čísel, pro která platí $1 < x < 1,5$ (jsou větší než 1 a menší než 1,5) nazývá **otevřený interval**, otevřený interval zapisujeme pomocí kulatých závorek $(1; 1,5)$.

Př. 2: Jaký je rozdíl mezi intervaly $\langle -2; 6 \rangle$ a $(-2; 6)$?


Intervaly $\langle -2; 6 \rangle$ krajní čísla -2 a 6, která interval $(-2; 6)$ neobsahuje. Jinak obsahují stejná čísla.

Interval $\langle -2; 6 \rangle$ obsahuje krajní body, které ho uzavírají \Rightarrow jde o uzavřený interval.

Interval $(-2; 6)$ neobsahuje krajní body, které by ho uzavíraly \Rightarrow jde o otevřený interval.

Př. 3: Zapiš vlastností pomocí nerovností a zakresli na číselnou osu množiny.


a) $A = (2; 10)$ b) $B = \langle -3; \sqrt{2} \rangle$ c) $C = (-\sqrt{2}; \infty)$ d) $D = \left(-\infty; \frac{2}{5} \right)$



b) $B = \langle -3; \sqrt{2} \rangle$ $B = \{x \in \mathbb{R}; -3 \leq x < \sqrt{2}\}$



c) $C = (-\sqrt{2}; \infty)$ $C = \{x \in \mathbb{R}; -\sqrt{2} < x\}$



d) $D = (-\infty; \frac{2}{5}]$ $D = \{x \in \mathbb{R}; x \leq \frac{2}{5}\}$



Př. 4: Které z intervalů z předchozího příkladu se označují jako neomezené intervaly?

Jde o intervaly

- $C = (-\sqrt{2}; \infty)$, obsahuje všechna čím dál větší čísla, jde ke kladnému nekonečnu,
- $D = (-\infty; \frac{2}{5}]$, obsahuje všechna čím dál menší čísla, jde k zápornému nekonečnu.

Př. 5: V každé z následujících množin najdi nejmenší a největší číslo.

- a) $\langle -2; 8 \rangle$ b) $\langle -5; \infty \rangle$ c) $\langle 4; 12 \rangle$

a) $\langle -2; 8 \rangle$

Nejmenším číslem je -2, největším číslem je 8.

b) $\langle -5; \infty \rangle$

Nejmenším číslem je -5, množina nemá největší číslo (protože ke každému číslu můžeme najít číslo o jedna větší).

c) $\langle 4; 12 \rangle$

Nejmenším číslem je 4, množina nemá největší číslo (číslo 12 do množiny nepatří, největší menší číslo není, protože k číslu 11,999999 můžeme pořád připsovat další devítky).

Př. 6: Napiš libovolný:

- a) zleva neomezený interval, b) polouzavřený interval.

a) zleva neomezený interval

$(-\infty; 123)$ - každý interval, který má vlevo mínus nekonečno.

b) polouzavřený interval

$\langle \pi; 13 \rangle$ - každý interval, která neobsahuje jeden z krajních bodů.

Př. 7: Vyznač na číselné ose všechna čísla, která patří do množiny $\langle 5; 1 \rangle$.

Není co vyznačovat na ose. Neexistují žádná čísla, která jsou zároveň větší nebo rovna 5 a menší nebo rovna 1.

Př. 8: Rozhodni, zda jsou následující výroky pravdivé. Výsledek zdůvodni.

a) $\frac{5}{2} \in (1; 2)$

b) $\sqrt{12} \in \langle 3; 4 \rangle$

c) $0,02^2 \in (0; 0,001)$

a) $\frac{5}{2} \in (1; 2)$. Nepravda: $\frac{5}{2} = 2\frac{1}{2} = 2,5 > 2$.

b) $\sqrt{12} \in \langle 3; 4 \rangle$. Pravda: $3 < \sqrt{12} < 4$, protože $3^2 = 9 < 12 < 16 = 4^2$.

c) $0,02^2 \in (0; 0,001)$. Pravda: $0,02^2 = 0,0004$, $0 < 0,0004 < 0,001$.

Př. 9: Pro číslo x platí $x \in (-2; 4)$ a zároveň $x \in (1; 6)$. Napiš množinu všech čísel, která mohou být číslem x .

$x \in (-2; 4)$ a zároveň $x \in (1; 6) \Rightarrow$ musí vyhovovat oběma podmínkám. Rozebereme si je postupně.

Dolní hranice (čísla, kterým se x rovná, nebo která jsou menší):

- $x \in (-2; 4) \Rightarrow x > -2$,
- $x \in (1; 6) \Rightarrow x > 1$,

\Rightarrow pokud má platit obojí, musí platit $x > 1$ (pak je automaticky větší i než -2).


Horní hranice (čísla, kterým se x rovná, nebo která jsou větší):

- $x \in (-2; 4) \Rightarrow x \leq 4$,
- $x \in (1; 6) \Rightarrow x \leq 6$,

\Rightarrow pokud má platit obojí, musí platit $x \leq 4$ (pak je automaticky menší i než 6).

Pro hledaná x platí: $x > 1$ a $x \leq 4 \Rightarrow x \in (1; 4)$.

Příklad můžeme snadno vyřešit obrázkem. Nakreslíme si oba intervaly a hledáme čísla, která patří do obou.



Číslem x může být libovolné číslo z intervalu $x \in (1; 4)$.

Př. 10: Pro číslo y platí $y \in (-\infty; 3)$ nebo $y \in (-1; 6)$. Napiš množinu všech čísel, která mohou být číslem y .

$y \in (-\infty; 3)$ nebo $y \in (-1; 6) \Rightarrow$ stačí, když číslo patří do jednoho z intervalů a vyhovuje podmínce. Rozebereme si je postupně.

Dolní hranice (čísla, kterým se y rovná, nebo která jsou menší):

- $y \in (-\infty; 3) \Rightarrow y$ může být libovolně malé číslo,
- $y \in (-1; 6) \Rightarrow x > -1$,

\Rightarrow pokud stačí splnit jednu z podmínek, může být y libovolně malé číslo (splňuje tak první podmínku a na druhé nezáleží).

Horní hranice (čísla, kterým se y rovná, nebo která jsou větší):

- $y \in (-\infty; 3) \Rightarrow y \leq 3$,
- $y \in (-1; 6) \Rightarrow y < 6$,

\Rightarrow pokud stačí splnit jednu z podmínek, stačí, když platí $y < 6$ (splňuje tak druhou podmínku a na první nezáleží).

Pro hledaná y platí: $y < 6 \Rightarrow y \in (-\infty; 6)$.

Příklad můžeme snadno vyřešit obrázkem. Nakreslíme si oba intervaly a hledáme čísla, která patří alespoň do jednoho z nich.



Číslem y může být libovolné číslo z intervalu $y \in (-\infty; 6)$.

Př. 11: Jarda převážel na káře židle nakoupené v obchodě. Ještě 5 km od obchodu náklad kontroloval a židle byly v pořádku. Při další kontrole (9 km od obchodu) jedna židle chybí. Jak daleko od obchodu mohla židle vypadnout? Vypiš všechny možné vzdálenosti.

Židle mohla vypadnout v libovolné vzdálenosti větší než 5 km a menší než 9 km. Řešením jsou tedy všechny čísla v intervalu $(5; 9)$.

Shrnutí: Hraniční body do otevřeného intervalu nepatří \Rightarrow prázdné kolečko, kulaté závorky.