

4.4.21 Nepřímá úměrnost I

Předpoklady: 040420

Př. 1: Která z následujících slovních úloh popisuje nepřímou úměrnost? Zapiš nepřímou úměrnost jako funkci.

a) 7 rohlíků stojí 21 Kč. Kolik bude stát 11 rohlíků?

b) Pokud se na kytku složí pouze 24 žáků přítomných ve třídě, bude každého z nich stát 27 Kč. Kolik by každého žáka stálo, kdyby se složili všech 32 žáků ve třídě?

c) Sešit, který si na matematiku koupilo 14 žáků ze třídy v obchodě stojí 12 Kč. Kolik Kč by sešit stál, kdyby si ho koupilo 21 žáků ze třídy?

Jedinou nepřímou úměrností je příklad v bodu b) (čím více žáků se složí na zakoupení kytky, tím menší cenu každý z nich zaplatí).


Závislost ceny na počtu přispívajících žáků bychom mohli napsat jako $y = \frac{24 \cdot 27}{x} = \frac{648}{x}$.

Př. 2: Najdi nejjednodušší nepřímou úměrnost. S pomocí tabulky načrtni graf této funkce. Urči její vlastnosti ($D(f)$, $H(f)$, ...).

Nejjednodušší nepřímá úměrnost: $y = \frac{1}{x}$.

Tabulka hodnot:

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
y	$-\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{2}$	-1	0	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$



Obrázek zatím nevypadá moc úplně. Zdá se, že pro velká x se hodnoty blíží nule (čím větší hodnoty budeme dosazovat za x , tím menší budeme získávat hodnoty y , ale stále to budou kladná čísla). Jak vypadá graf v okolí nuly?


Stačí přidávat sloupce pro kladné hodnoty, graf je souměrný podle počátku.

Prozkoumáme chování funkce pro $x \in (0;1)$.

x	-3	-2	-1	0	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$	1	2	3	8
y	$-\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{2}$	-1	0	8	3	2	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{8}$

Když se hodnoty x blíží k nule (a jsou kladné), hodnoty y se blíží k nekonečnu.

Když se hodnoty x blíží k nule (a jsou záporné), hodnoty y se blíží k minus nekonečnu.



Vlastnosti: $D(f) = R - \{0\}$, $H(f) = R - \{0\}$, funkce je klesající v intervalech $(-\infty; 0)$ a $(0; \infty)$.

Pedagogická poznámka: Většina žáků nakreslí graf správně, mnozí však spojí body $[-1; -1]$ a $[1; 1]$ přímou čarou a moc se nezajímají o to, jak bude funkce v okolí nuly vypadat. V takovém případě se snažím tlačit zahuštění tabulky o hodnoty, které jim chybějí k představě grafu a k představování si hodnot, který by získali z dalších čísel podobných číslům v tabulce.

Př. 3: Graf funkce druhá mocnina $y = x^2$ byl osově souměrný podle osy y , protože hodnoty navzájem opačných čísel se rovnaly (platilo $f(x) = f(-x)$). Pokus se najít podobnou vlastnost u nepřímé úměrnosti.

Graf nepřímé úměrnosti má dva druhy souměrnosti.

Graf je středově souměrný podle počátku soustavy souřadnic (podle bodu $[0; 0]$).


Z kladných hodnot x , získáváme kladné hodnoty y , ze záporných hodnot x záporné hodnoty y .

Například: $[1; 1]$ a $[-1; -1]$ se liší jen ve znaménkách, stejně tak $\left[2; \frac{1}{2}\right]$ a $\left[-2; -\frac{1}{2}\right]$ nebo

$\left[\frac{1}{3}; 3\right]$ a $\left[-\frac{1}{3}; 3\right]$.

Z opačného čísla získáme stejnou hodnotu, ale s opačným znaménkem (můžeme to zapsat jako $f(-x) = -f(x)$ (konkrétně například $-\frac{1}{3} = f(-3) = -f(3) = -\frac{1}{3}$).

Graf je osově souměrný podle grafu funkce $y = x$. Pokud prohodíme x a y získáme bod, který opět leží na grafu.



Jako nepřímou úměrnost označujeme funkci $f : y = \frac{k}{x}$, $x \in \mathbb{R} - \{0\}$, kde k je nenulové reálné číslo zvané koeficient nepřímé úměrnosti f . Grafem nepřímé úměrnosti je hyperbola.

Př. 4: Nepřímá úměrnost je (podobně jako druhá mocnina je speciálním případem kvadratické funkce) speciálním případem lineární lomené funkce (každá funkce, zapsatelná ve tvaru $y = \frac{ax+c}{bx+d}$). Nakresli grafy lineárních lomených funkcí (příklad se snaž vyřešit bez tabulky s vypočtenými hodnotami pouze porovnáním s grafem nepřímé úměrnosti). Urči definiční obory a obory hodnot.


a) $y = \frac{1}{x} + 1$

b) $y = \frac{1}{x} - 2$

c) $y = \frac{1}{x} + \sqrt{5}$

a) $y = \frac{1}{x} + 1$


Hodnoty funkce $y = \frac{1}{x} + 1$ jsou o jedna větší než odpovídající hodnoty funkce $y = \frac{1}{x}$ (kvůli přičtení jedničky) \Rightarrow graf funkce $y = \frac{1}{x} + 1$ je vůči grafu funkce $y = \frac{1}{x}$ posunutý o 1 nahoru.



$$D(f) = \mathbb{R} - \{0\}, H(f) = \mathbb{R} - \{1\}$$

b) $y = \frac{1}{x} - 2$


Hodnoty funkce $y = \frac{1}{x} - 2$ jsou o dvě menší než odpovídající hodnoty funkce $y = \frac{1}{x}$ (kvůli odečtení dvojky) \Rightarrow graf funkce $y = \frac{1}{x} - 2$ je vůči grafu funkce $y = \frac{1}{x}$ posunutý o 2 dolů.



$$D(f) = \mathbb{R} - \{0\}, H(f) = \mathbb{R} - \{-2\}$$

c) $y = \frac{1}{x} + \sqrt{5}$

Hodnoty funkce $y = \frac{1}{x} + \sqrt{5}$ jsou o $\sqrt{5}$ větší než odpovídající hodnoty funkce $y = \frac{1}{x}$ (kvůli přičtení $\sqrt{5}$) \Rightarrow graf funkce $y = \frac{1}{x} + \sqrt{5}$ je vůči grafu funkce $y = \frac{1}{x}$ posunutý o $\sqrt{5}$ nahoru.



$$D(f) = \mathbb{R} - \{0\}, H(f) = \mathbb{R} - \{\sqrt{5}\}$$

Př. 5: Nakresli grafy lineárních lomených funkcí (případ se snaž vyřešit bez tabulky s vypočtenými hodnotami, pouze porovnáním s grafem nepřímé úměrnosti). Urči definiční obory a obory hodnot.

a) $y = \frac{1}{x-1}$

b) $y = \frac{1}{x+2}$


c) $y = \frac{1}{x-3} + 2$

a) $y = \frac{1}{x-1} : x-1 \neq 0 \Rightarrow x \neq 1$

Hodnotu, kterou dosazujeme do funkce nejdříve zmenšíme o jedna (odečtení jedničky ve jmenovateli), teprve pak získanou hodnotou dělíme (u původní funkce $y = \frac{1}{x}$ dělíme původní

dosazenou hodnotou) \Rightarrow do funkce $y = \frac{1}{x-1}$ musíme dosadit číslo o 1 větší než do funkce

$y = \frac{1}{x}$ abychom získali stejnou hodnotu $y \Rightarrow$ graf funkce $y = \frac{1}{x-1}$ bude posunutý o 1 doprava.



$$D(f) = \mathbb{R} - \{-2\}, H(f) = \mathbb{R} - \{0\}$$


b) $y = \frac{1}{x+2}: x+2 \neq 0 \Rightarrow x \neq -2$

Hodnotu, kterou dosazujeme do funkce nejdříve zvětšíme o dvě (přičtení dvojky ve jmenovateli), teprve pak získanou hodnotou dělíme (u původní funkce $y = \frac{1}{x}$ dělíme původní

dosazenou hodnotou) \Rightarrow do funkce $y = \frac{1}{x+2}$ musíme dosadit číslo o 2 menší než do funkce

$y = \frac{1}{x}$ abychom získali stejnou hodnotu $y \Rightarrow$ graf funkce $y = \frac{1}{x+2}$ bude posunutý o 2

doleva.




$$D(f) = \mathbb{R} - \{3\}, H(f) = \mathbb{R} - \{2\}$$


c) $y = \frac{1}{x-3} + 2: x-3 \neq 0 \Rightarrow x \neq 3$

Graf kreslíme postupně.

Hodnotu, kterou dosazujeme do funkce nejdříve zmenšíme o tři (odečtení trojky ve jmenovateli), teprve pak získanou hodnotou dělíme (u původní funkce $y = \frac{1}{x}$ dělíme původní dosazenou hodnotou) \Rightarrow do funkce $y = \frac{1}{x-3}$ musíme dosadit číslo o 3 větší než do funkce $y = \frac{1}{x}$ abychom získali stejnou hodnotu $y \Rightarrow$ graf funkce $y = \frac{1}{x-3}$ bude posunutý o 3 doprava.



Hodnoty funkce $y = \frac{1}{x-3} + 2$ jsou o dvě větší než odpovídající hodnoty funkce $y = \frac{1}{x-3}$ (kvůli přičtení dvojky) \Rightarrow graf funkce $y = \frac{1}{x-3} + 2$ je vůči grafu funkce $y = \frac{1}{x-3}$ posunutý o 2 nahoru.



$$D(f) = \mathbb{R} - \{3\}, H(f) = \mathbb{R} - \{2\}$$

Shrnutí: Grafem nepřímé úměrnosti je hyperbola (pro velká x se blíží k nule, pro malá kladná x se blíží k nekonečnu).